

كتاب المعارف العلمي

أسماك الزينة والسلاحف المائية

دكتور حسين عبد الحى قاعود



١٦



دارالمعارف

كتاب المعارف العلمى

**أسماك الزينة
والسلاحف المائية
(صحة ورعاية وتربية)**

تأليف

الأستاذ الدكتور

حسين عبد الحى قاعود

أستاذ صحة الحيوان والدواجن والأسماك والبيئة

كلية الطب البيطرى - جامعة القاهرة



دارالمعارف

تنفيذ الغلاف والـمتن :
المركز الإلكتروني
بدار المعارف

| | |
|----------------|--------------------|
| رقم الإيداع | ٢٠٠٠/١٦٣٠٩ |
| الترقيم الدولي | ISBN 977-02-6075-4 |

١/٢٠٠٠/٣٠

طبع بمطابع دار المعارف (ج . م . ع .)

الناشر : دار المعارف ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة - ج . م . ع .

مقدمة

إن تربية ورعاية أسماك الزينة تُعد من أرقى وأجمل الهوايات التي تساعد على الهدوء والسكينة والاستقرار النفسى بالإضافة إلى الإحساس بالجمال والبهجة لما لأسماك الزينة من ألوان بديعة وأشكال رائعة وأحجام مختلفة ومتنوعة.

وهواية تربية أسماك الزينة تُعد بالنسبة للصغار والشباب من الهوايات المحببة والتي لها دورًا كبيرًا فى تكوين شخصية الفرد وتنمية قدرته على التفكير والاستنباط العلمى.


هذا بالإضافة إلى أنه بتأمل سلوكيات وطبائع هذه الكائنات والأنشطة المختلفة التى تقوم بها من أجل البقاء.. نجد أن يد الله تظهر بصماتها جلية وواضحة والتي تدل على وحدة الخلق..

ومن ثم فإن هذا المؤلف هو مشاركة ومعاونة لمحبي وعُشاق تربية أسماك الزينة والسلاحف المائية لحل معظم مشاكل التربية بطرق علمية ومعرفة أساسيات رعاية هذه الكائنات على الوجه الأمثل للحصول على أكبر قدر من المتعة والجمال فى تربية ورعاية هذه الكائنات.

الفصل الأول

أساسيات التربية

التركيب الظاهري لجسم الأسماك



شكل (١) : التركيب الظاهري للجسم

تختلف الأسماك فى الشكل والحجم وعدد الزعانف وشكلها وشكل فتحة الفم وكذلك فى وجود أو عدم وجود زوائد لحمية على الجسم وكذلك القشور والألوان. ولكن الشكل العام يتركب من: (شكل ١)

١- الزعانف:

وظيفة الزعانف غاية فى الأهمية بالنسبة للأسماك وحركتها فهناك زعانف للاندفاع للأمام وأخرى للاتجاه أو حفظ التوازن والسكون وللأسماك زعنفة ظهرية وزعنفتان صدريتان وزعنفتان بطنيتان وزعنفة شرجية وذيلية.

٢- الجلد:

وهو الغطاء الخارجى للجسم ويتكون من طبقتين ويوجد فوقهما طبقة القشور ويعلوها طبقة مخاطية تقي الأسماك من غزو الميكروبات والطفيليات لجسم السمكة.

وهى خط الدفاع الأول ضد الإصابة بالأمراض ويؤثر على تكوينها الأس الأيدروجينى لماء الحوض وكذلك درجة حرارة الماء.

٣ - الخياشيم:

وهى عبارة عن رقائق من الأغشية والدعامات الغضروفية وهى غنية بالأوعية الدموية ومحمية بغشاء ويغطيها غطاء الخياشيم وهى عضو التنفس فى الأسماك حيث تمتص الأوكسجين الذائب فى الماء وتستخلصه وتنقله إلى الدم وتخلص كذلك الجسم من غاز ثانى أكسيد الكربون.

وهناك بعض الأنواع من الأسماك مثل الفيترو الجرامى تبلع جزءاً من الهواء لوجود جزء رئوى بالجسم.

٤ - العين:

تختلف عن عين الإنسان فهى تتميز بقدرة فائقة على التكيف وكذلك تتميز بحدة النظر سواء فى الليل أو النهار ولكن ليس لها جفون.

٥ - حواس الشم والتذوق:

تتميز الأسماك بحاستى تذوق وشم قويتين فى فتحتا الأنف ومقدم الفم.

٦ - الخط الجانبى:

يوجد خط جانبى على جوانب الأسماك وهو عبارة عن فتحات دقيقة تغطيها قشور رقيقة وهذه الفتحات متصلة بقناة بها أعضاء صغيرة للإحساس بالذبذبات المائية والتغيرات الكيميائية التى تحدث بالوسط المائى ويوجد كذلك قنوات إحساس على الرأس.

الحركة فى الأسماك:

يتحكم فى حركة الأسماك الزعانف الموجودة بالجسم.


كما يتحكم فى طفو وغوص الأسماك أو السكون (المثانة الهوائية) التى توجد بداخل الجسم تحت السلسلة العظمية وهى مثل البالونة، وهى تدفع السمكة إلى أعلى إذا ملئت بالهواء والعكس إذا أفرغت من الهواء ويتحكم فى هذه العملية غدة خاصة بالمثانة لها القدرة على امتصاص الهواء أو فقد فقاعات الهواء من الدم (عندما يزيد الحجم تقل الكثافة والعكس صحيح).

أحواض التربية

أنواع وشروط أحواض التربية

تربى أسماك الزينة فى أحواض تربية زجاجية (شكل ٢ ، ٣ ، ٤) ذات سعات مختلفة منها الصغير الذى سعته ٨ لتر أو ١٢ لتر ومنها المتوسط الذى سعته ٦٠ لتر ومنها الكبير الذى يبلغ ٨٠ أو ١٢٠ لتراً. ومنها الصغير جداً الذى سعته ٠,٥ - ١ لتر وهو مربع الشكل ويصلح لتربية سمكة واحدة تتحمل نقص الأوكسجين مثل أسماك الفيتير (مقاتل سيامين).


كذلك تربى الأسماك فى الدوارق الزجاجية البيضاوية (فازة) وتستخدم لتربية أنواع معينة من أسماك الزينة مثل الفيتير والجرامى والسمكة الذهبية بشرط أن تكون أعمار هذه الأسماك صغيرة وأطوالها مناسبة لهذه الدوارق الزجاجية. ولكن يشترط ألا تملئ بالكامل بالماء ويفضل ملئ ثلثي حجمها.




شكل (٢) : حوض زجاجى مناسب لتربية الأسماك

سعة ١٥ جالون وأبعاده ٢٤ × ١٢ بوصة


(الجالون + ٣,٨ لتر)




شكل (٤): حوض زجاجى يصلح
لتربية أسماك الزينة



شكل (٣): حوض زجاجى يصلح
لتربية أسماك الزينة



شكل (٥): حوض زجاجى غير صلب لتربية أسماك الزينة



شكل (٦) : المعدات اللازمة لحوض التربية

الشروط الواجب توافرها في حوض التربية:

- يجب أن يكون الحوض أملس حتى لا تعلق به المخلفات والرواسب.
- أن يكون سهل التنظيف ولا يتفاعل مع الماء.
- صلب يتحمل ضغط عمود الماء بداخله ولا يرشح الماء وذو سعة مناسبة لعدد وأطوال الأسماك
- ذو درجة شفافية عالية.

المساحة المتاحة للأسماك فى الحوض

من الأمور الهامة لصحة ونمو وتكاثر الأسماك هى توفير المساحة المتاحة للأسماك فى الحوض تفادياً للمشاكل التى تنشأ أثناء التربية والازدحام الذى يؤدى فى كثير من الأحيان إلى ظهور الأمراض المختلفة التى تصيب الأسماك وسرعة نفوقها كذلك لتحاشي قذارة الماء بالحوض والمجهود الذى يبذل لتغيير ماءه ونظافته لذلك يجب الإلمام بهذه المقاييس:

• حساب سعة الحوض:

ويمكن حساب سعة الحوض باللترات من المعادلة الآتية:
سعة الحوض باللتر =

$$\frac{\text{العرض سم} \times \text{ارتفاع الماء سم (وهو المسافة بين سطح الحصى و سطح الماء)} \times \text{الطول سم}}{1000}$$

• عدد اللترات اللازمة للسكة من مياه الحوض وتحسب من المعادلة الآتية:

$$\text{عدد اللترات اللازمة} = \text{طول السكة بالسنتيمتر} \times 2 \text{ (معامل ثابت)}$$

مثال: حوض سعته ٦٠ لتراً

$$\frac{60}{2 \times 2} = \frac{\text{سعة الحوض باللتر}}{\text{طول السكة سم} \times 2} = \text{عدد الأسماك التى يمكن وضعها فى الحوض}$$

(إذا كان طول السكة ٢ سم) طول السكة سم $\times 2$ = ١٥ سكة

أو بطريقة أخرى كالآتى:

$$\frac{60}{15} = \frac{\text{سعة الحوض}}{\text{احتياجات السكة من اللترات}} = \text{عدد الأسماك}$$

ويمكن تربية أسماك بأطوال مختلفة فالحوض الذى سعته ٦٠ لتراً يمكن تربية الأطوال الآتية :

١٠ أسماك بطول ١ سم
٥ أسماك بطول ٢ سم
٢ سمكة بطول ٤ سم وهكذا..

المعدات اللازمة لحوض التربية

الفلتر:

الفلتر ضرورى لترشيح الماء بصفة مستمرة وذلك للتخلص من الفضلات العالقة بالماء. وتعتمد فكرته على ترشيح الماء من خلال طبقة من الصوف الزجاجى أو الإسفنج أو الكربون أو حصى الحوض.

أنواع الفلاتر:

• الفلتر الإسفنجي: (شكل ٧)

ويعتمد على دفع الهواء على هيئة فقاعات فى العمود فتتصاعد ثم تنزل من الفتحة العليا فيحدث خلخلة فى العمود فيمر الماء من الحوض إلى المرشح ويخرج الماء نقياً وتبقى الفضلات عالقة فى المرشح. وفتحة هذا الفلتر يجب أن تكون أعلى سطح الماء مباشرة.

• الفلتر الفانوسى:

وهو ذو كفاءة عالية فى الترشيح وسحب غاز ثانى أكسيد الكربون من ماء الحوض. ويجب أن تنظف المادة المرشحة أو المرشح (الصوف الزجاجى) مرة كل أسبوع.


• الفلتر ذو مضخة الماء : (شكل ٨ ، ٩)

ذو كفاءة عالية فهو يسحب الماء من خلال موتور خاص به فيمر الماء على المرشح بمعدل ٣٠٠ لتر ماء/ساعة.


ومن مميزاته أنه يعمل لمدة ٣ ساعات / يومين فقط.

• الفلتر الحصى (المرشح الحصى):


يوضع لوح من البلاستيك قريباً في أبعاده من أبعاد الحوض بحيث يكون له حافة قدرها ١ - ١,٥ سم. ويتم حفر ثقوب على مسافات منتظمة في أحد زوايا اللوح. ثم عمل ثقب بقطر ٢,٥ سم لإدخال أنبوبة الهواء. ويسكب الحصى على اللوح ليكون المرشح الطبيعي.



شكل (٧): فلتر إسفنجي يركب من الخارج



شكل (٨): فلتر يركب من الخارج ويحتوى على مضخة هواء





شكل (٩) : الفلتر ذو المضخة القوية

• الفلتر الأرضي أو البيولوجي: (شكل ١٠)

ويعمل بقوة مضخة الهواء حيث يمر الهواء خلال الحصص والممرات خلال الفلتر فيؤدي إلى تنقية مياه الحوض وتحجز البكتيريا في الممرات وفي الوقت نفسه يتشبع الماء بالأكسجين مع الحركة المستمرة لسطح المياه.

وتعتمد فكرته على إدخال الهواء في العمود الرأسى وسقوط الماء من الفتحة العليا بالجاذبية الأرضية فيحدث تخلخل في الضغط أسفل الفلتر. ومن مميزاته

أن لا يحتاج إلى تنظيف. وهو مفيد للنباتات وتحويل الفضلات إلى نيترات حيث يقوم النبات بامتصاصها كسماد له.




شكل (١٠): الفلتر الأرضي أو البيولوجي

مضخة الهواء (الموتور): (شكل ١١)

وفائده هو ضخ الهواء في الماء تحت ضغط فيذوب جزء من أكسجين الهواء في الماء والتخلص من ثاني أكسيد الكربون الناتج عن تنفس الأسماك. ويتصل بالموتور خرطوم يدخل عن طريقة الهواء إلى ماء الحوض. ولدفع الهواء فقط في ماء الحوض يتم وصل الخرطوم بحجر مسامي (السكر) يسمح بخروج الهواء على هيئة فقاعات صغيرة. ويوضع الحجر المسامي في قاع الحوض ويفضل الحجر المصنوع من السيراميك.

ولتنظيف الماء وترشيحه من الفضلات يتم توصيل الموتور بالفلتر بطريقة معينة ويجب أن يوضع الموتور أعلى من مستوى الماء في الحوض.



شكل (١١): مضخة الهواء أو الموتور العادي


(الحرارة) السخان:

تحتاج الأسماك إلى درجة حرارة ٢٤ - ٢٨°م وهي الدرجة المثلى للنمو والتكاثر. ويمكن قياس الحرارة بعدة أنواع من الترمومترات.


- عند انخفاض درجة حرارة الحوض: يمكن استخدام السخان (شكل ١٢) ذو الترموستات ويفضل هذا النوع فهو يضبط وينظم الحرارة أوتوماتيكياً ويضبط عند درجة ٢٦°م.



شكل (١٢): سخان به ترموستات



شكل (١٣ - أ) : سخان عادي



شكل (١٣ - ب) : سخان يوضع تحت الحص بقاء الحوض (سخان أرضي)

كيفية وضع السخان

يوضع بقاع الحوض فى المنتصف وهو الوضع الأمثل للسخان لتوزيع الحرارة بانتظام لجميع أجزاء الحوض.

الإضاءة عن طريق اللمبات:

الإضاءة هامة لنمو النباتات ومنع نمو الطحالب الضارة.

والإضاءة نوعين:

- لمبات الفلورسنت وتوضع فى أعلى منتصف الحوض حيث توزع الإضاءة المتجانسة فى الحوض. وهذا النوع من الإضاءة مفضل.
- لمبات الأشعة تحت الحمراء يمكن استخدامها ولكن لا تزيد الإضاءة عن ٨٠ وات للحوض.

الاحتياطات الواجب مراعاتها:

- ١ - مصدر الإضاءة يجب أن يكون بعيداً عن مستوى سطح الماء بحوالى ١٠ - ١٥ سم وأن يكون من أعلى حتى لا تتأثر الأسماك.
- ٢ - فترة الإضاءة المثلى ١٢ ساعة.
- ٣ - الإضاءة والإظلام يتمان بالتدريج حتى يتعود عليهما السمك.

كيفية حساب قوة السخان

اللازمة لتدفئة الحوض فى الشتاء

فى الشتاء تنخفض حرارة الماء بالحوض لذلك تستخدم سخانات للوصول إلى درجة حرارة مثلى ويجب أن يمد الحوض بالسخان المناسب حتى يمكن التحكم فى درجة الحرارة ودرجة الحرارة المثلى هي ٢٤ - ٢٨°م ويجب ألا تقل عن ٢٢°م ولا تزيد عن ٣٠°م.

ويمكن حساب قوة السخان (بالوات) المناسبة لكل حوض بفرض أن كل ٢ لتر من ماء الحوض تحتاج إلى واحد وات.

فمثلاً: إذا كانت سعة الحوض ١٠٠ لتر فإنه يحتاج إلى سخان قوته $\frac{1}{2}$ = ٥٠ وات.

ويفضل مراعاة الآتى:

- ١ - متابعة درجة الحرارة بالحوض باستخدام ترمومتر القياس (ترمومتر قياس درجة حرارة ماء الحوض الشريط أو الزجاج اللذان يثبتان على زجاج الحوض تحت منسوب الماء) وخاصة عند استخدام السخان حتى لا ترتفع درجة حرارة ماء الحوض عن المعدل المطلوب.
- ٢ - يفضل استخدام سخان مزود بترموستات لفصل السخان عندما تصل درجة الحرارة إلى المعدل (شرح من باب المعدات اللازمة للحوض).
- ٣ - فى الصيف ترفع سخانات.

سمك الأحواض:

يجب الانتباه لسمك الحوض حتى لا يرشح أو ينشرخ لذلك يجب مراعاة سمك الزجاج المستخدم بالنسبة لحجم وسعة الحوض كالاتى:

- الأحواض
- | | |
|------------------|----------------------------|
| ٣٠ × ٢٠ × ١٠ سم | يجب ألا يقل السمك عن ٢ مم |
| ٤٠ × ٣٠ × ٢٠ سم | يجب ألا يقل السمك عن ٣ مم |
| ١٠٠ × ٦٠ × ٣٠ سم | يجب ألا يقل السمك عن ٤ مم |
| ١٥٠ × ٥٠ × ٣٠ سم | يجب ألا يقل السمك عن ٦ مم |
| ٢٠٠ × ٦٠ × ٤٠ سم | يجب ألا يقل السمك عن ١٠ مم |

كيفية حساب قوة الإضاءة

وعدد المبات للحوض

عدد الواتات (Watts) يمكن حسابها من القانون الآتي:

طول الحوض بالبوصة $\times 32$ (ثابت)

$$\text{عدد الواتات (قوة اللبة)} = \frac{\text{عدد ساعات الإضاءة للحوض}}{\text{طول الحوض بالبوصة} \times 32}$$

فمثلاً إذا كان طول الحوض ٤٠ بوصة وعدد الساعات المراد إضاءة الحوض

خلالها ١٠ ساعات فيمكن حساب عدد الواتات كالتالي:

$$\text{عدد الواتات} = \frac{40 \times 32}{10} = 128 \text{ وات}$$

فيمكن استخدام ٣ لمبات قوة ٤٠ وات.

قاع الحوض (فرش قاع الحوض)

لا يحبذ استخدام الرمل وذلك لعيوبه الكثيرة ولكن يفضل استخدام حصي البحر وهو أفضل أرضية يفرش بها الحوض حيث أن الحصى يساعد على نمو النباتات وعدم تعكير ماء الحوض. والحصى ذو القطر ٣ مم يعتبر الأفضل للاستخدام ويراعى أن يضاف إليه الحصى الأكبر ولكن بمعدل ثلثي حصي صغير وثلث حصي كبير.

خطوات إعداد الحوض للتربية

ملئ وإعداد الحوض: مواصفات الماء اللازم للأسماك فى الحوض

تحتاج الأسماك إلى ماء ذى مواصفات خاصة وهى كالتالى:

● أن يكون خاليا من الكلور وخاصة عند استخدام ماء الصنبور فيجب إضافة قليل من مادة ثايوسلفات الصوديوم الذى يتعادل مع الكلور المذاب فى الماء أو ترك مياه الصنبور، فى أحد الأوعية لمدة ثلاث أيام حتى يتم التخلص من الكلور.

● أن يكون خاليا من عسر الأملاح الشديد وخاصة عند استخدام مياه آبار ولكن يمكن التخلص من الأملاح الزائدة بإضافة قليل من محلول كربونات الصوديوم ($\frac{1}{4}$ جم تذاب فى ١٠٠ سم^٣ ماء) إلى الماء الموضوع فى أوعية بلاستيكية حتى يترسب كربونات الكالسيوم والأملاح الأخرى ثم يستخدم الماء الرائق.

● درجة الأس الأيدروجينى


الأسماك التى تعيش فى المناطق الحارة وشبه الحارة تفضل الماء المتعادل أو المائل للحموض (PH ٧ فأقل: ٦,٥ - ٧) ويمكن قياس درجة الأس الأيدروجينى للماء قبل استعماله بواسطة شرائط خاصة (مبينة بالشكل) فإذا كانت درجة الـ PH أكثر من ٧ فيضاف قطرات من حامض الأيدروكلوريك المخفف (١ سم^٣ من الحامض المركز تضاف إلى ١٠٠ سم^٣ من الماء لعمل محلول مخفف من الحامض) وتقاس درجة الـ PH حتى تصل إلى ٦,٥ - ٧ وفى حالة زيادة الحموضة (الـ PH أقل من ٦,٥) فيمكن إضافة محلول بيكربونات الصوديوم للماء تدريجياً إلى الماء حتى تصل درجة الـ PH إلى ٦,٥ - ٧ ويمكن التأكد من ذلك باستخدام ورق أو شريط قياس درجة الأس الأيدروجينى بعد ملئ الحوض بالماء:

يتم توصيل الوصلات الكهربائية ويشغل موتور دفع الهواء وينقل السمك إلى الحوض بعد أقلمته تدريجيًا لمياه الحوض الجديدة وذلك بتقليل الماء بالوعاء الذى به السمك (حوالى $\frac{1}{3}$ حجم الماء) يتم وضع ماء من الحوض تدريجيًا لوعاء السمك حوالى $\frac{2}{3}$ الباقي وتأخذ هذه العملية حوالى ١٥ دقيقة ثم بنقل السمك من الوعاء إلى ماء الحوض بواسطة الشبكة.


ملاحظة

كيفية ملء الحوض

- يملأ الحوض حتى ارتفاع ١٠ سم.
- توضع التوصيلات الهوائية فوق لقاع.
- يوضع فوقها الحصى لتثبيتها فى مكانها ويوضع الحصى بعد وضع الماء عند هذا الارتفاع.
- ولعدم تعكير الماء وتقليب الحصى توضع قطعة من الفلين على سطح الماء ثم يتم وضع الماء فى الحوض على قطعة الفلين.
- عندما يمتلئ الحوض إلى الربع توضع النباتات المائية فى أماكنها.
- يملأ الحوض بعد ذلك بالكامل حتى ارتفاع يقل ٥ - ١٠ سم من ارتفاع زجاج الحوض.



كيفية قياس خواص
مياه الحوض باستخدام
الطرق السريعة.




النباتات المائية بالحوض وأنواعها وخصائصها

فوائد النباتات المائية بالحوض

تعتبر النباتات المائية من أهم أساسيات البيئة المناسبة لمعيشة وتكاثر الأسماك فوظيفة النباتات في حوض التربية يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

● في ضوء النهار تقوم النباتات بالتمثيل الغذائي لتكوين الاحتياجات الغذائية لها وذلك بامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من ماء الحوض وإعطاء الأوكسجين للماء اللازم لتنفس الأسماك.

● تحافظ على اتزان كيميائية ماء الحوض وذلك بامتصاص النيتروجين الناتج من فضلات الأسماك والغذاء (حتى لا يتحول إلى غاز النوشادر أو النوشادر الغير متأينة السامة جداً للأسماك) (انظر الشكل ١٤) وفي الليل تعطي غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يدخل في دورات خاصة للحفاظ على درجة الأس الأيدروجيني لماء الحوض. كذلك تحول دون نمو الطحالب المضرة بالأسماك.



شكل (١٤): الدورة الطبيعية بالحوض وتساعد غاز الأوكسجين نتيجة التمثيل الضوئي للنبات

- غذاء للأسماك (لبعض أنواع من الأسماك).
- هام لتوازن البيئة المائية فى الحوض ويعطى المناخ الطبيعى والبيئى للأسماك كالطبيعة.
- هام فى عملية التفريخ حيث أن كثير من الأسماك تبيض على أوراقه ويتم إخصاب البيض بجوار النباتات وكذلك فهو ملجأ لصغار السمك حديثه الفقس والسمك المولود بالإضافة إلى منظره الجميل كديكور للحوض فيعطى إحساساً بالجمال.

أهم أنواع النباتات المائية

المناسبة لحوض التربية



شكل (١٥): أجيريا

- أجيريا *Egeria densa* لونه أخضر فاتح وهو نبات سريع النمو وله قدرة كبيرة على مد ماء الحوض بالأوكسجين (شكل ١٥).




شكل (١٦): لودجيا

- لودجيا ناتانس *Ludgia Natans* وهو نبات جذاب لونه أحمر ويستخدم في الأحواض التي لا تستخدم سخانات (شكل ١٦).



شكل (١٧): نورموفيل

- نورموفيل ستريكتا *Normophila Stricta* الأوراق خضراء براقّة وله ساق خشبي وهو نبات جيد النمو (شكل ١٧).



شكل (١٨): فاليسناريا


- فاليسناريا تورتييفوليا *Vallisneria Tortifolia*
الأوراق حلزونية ملتوية وهو نبات سريع
التكاثر ولكنه يحتاج إلى رمل مخلوط
بالحصى وضوء ساطع (شكل ١٨).



شكل (١٩): أميزون

- أميزون Amazon يحتاج إلى حوض ارتفاعه
أكثر من ٣٠ سم ويزرع على عمق بسيط في
وسط الحوض وهو نبات له شكل جميل
وله ولدة بحيث يمكن فصل الساق التي لها
جذور وزرعها من جديد (شكل ١٩).

- أنوبس نانا *Anubias Nana* طوله حوالى
٢٠ سم ولكنه ينمو ببطء ويحتاج ماء يسر.



شكل (٢٠): كابومبا

- كابومبا *Cabomba* يزرع على عمق ٢,٥ سم أسفل
الحصى بالحوض ويعطى شكل مروحي (شكل ٢٠).

- كريبتوكورين Coptocoryne طوله يصل إلى ٤٠ سم وينمو ببطء ويحتاج ماء يسر وإضاءة قوية (شكل ٢١).



شكل (٢١): كريبتوكورين

- أروهد Sagitaria Natans نبات قمة فى الجمال له أوراق تشبه رأس السهم والأوراق عريضة ولها ساق جارية ممتدة ولكنه يحتاج إلى أحواض عميقة لا يقل ارتفاعها عن ٥٠ سم (شكل ٢٢).




شكل (٢٢): أروهد

- ذيل الثعلب Foxtail يشبه ذيل الثعلب ويتلون باللون الأحمر على فترات من حياته بشرط توفر الماء النظيف وله براعم تفصل نفسها ثم تغوص فى القاع وتعطى نباتات جديدة (شكل ٢٣).



شكل (٢٣): ذيل الثعلب



شكل (٢٤): بستيا

- بستيا Pistia نبات يسمى خس الماء وهو يطفو وله جاذبية خاصة وجذوره تمتد إلى أسفل وقطره ٢٠ سم (شكل ٢٤).

- أبو نجيتون بلفاسيوس Apongeton Pulvaceus يصل طوله إلى ٣٥ سم وذو لون أخضر فاتح.

- أكوريوس جرامينيس Acorus Gramineus يصل طوله ٣٠ سم وينمو ببطء ويحتاج لحوض عميق.



شكل (٢٥): اكينودوروس تنيليس

- أكينودوروس تنيليس Echinodorus Tenellns نبات يتكاثر سريعاً عن طريق جذور ممتدة جارية وطوله يصل إلى ٨ سم (شكل ٢٥).



شكل (٢٦): اكينودوروس راديكانس

- اكينودوروس راديكانس Echinodorus أوراقه طويلة إلى حد ما وتأخذ شكل القلب ويحتاج إضاءة متوسطة وماء يسر (شكل ٢٦).

النباتات اللازمة

لحوض التربية

كيفية غرس النبات


يجب اتباع الخطوات الآتية: (شكل ٢٧)

- يملأ الحوض بالماء حتى ربع ارتفاع وبعد وضع الرمل والحصى أو مادة القاع (بحيث لا يقل سمك مادة القاع عن ٥ سم).
- النبات ذو الجذور تغرس بحيث توضع الجذور تحت الحصى بينما النبات الذى ليس له جذور فيغرس فى قاع الحوض تحت مستوى الحصى بمسافة ١ - ٢ سم.
- توضع النباتات وتوزع بطريقة جمالية فى الحوض.
- النباتات الفردية تغرس فردية بينما النباتات المتشعبة والمتشابهة تربط بواسطة حلقة مطاطية (استيك) ويوضع جزء منها تحت الحصى.
- تغرس النباتات باليد أو بالعصى المخصصة لذلك (شكل ٢٨)


احتياجات النباتات:

لكى ينمو النبات بطريقة طبيعية يجب ضبط العوامل البيئة الآتية:

- ١ - الإضاءة الصناعية المناسبة.
- ٢ - درجة الأس الأيدروجينى والقلوية وعسر الماء والمواد الذائبة.



شكل (٢٧): كيفية غرس النبات بقاع الحوض



شكل (٢٨): العصا المشقوقة التي تستخدم لتثبيت النباتات بقاع الحوض

الفصل الثانى

أسماك الزينة

أهم أنواع الأسماك

التي يمكن تربيتها بالأحواض

عائلة شيكليدى - Faunily Cichlidae

١ - الانجل (ملك السمك) Petrophyllum (Angel)

قلق وفضولى ويتميز بالذكاء الشديد والثقة والاطمئنان دوت ارتباك (كوطنه الأصلى) جنوب أمريكا (شكل ٢٩).

يصل طوله إلى ١٥ سم - طويل ورفيع - الزعنفة الظهرية والذيلية ضخمة.

وسمكة الانجل المشهورة هى الفضية وبها أربعة خطوط سوداء.

التغذية:

تحتاج كمية كبيرة من البروتين مثل اللحوم - الدافينا - يرقات الناموس والدود الحى وكذلك الكبد المجزأ إلى قطع صغيرة واللحم المفروم والأكل المجفف.

المياه:

الحمضية قليلاً والمياه البسرة - والانجل يحب المياه النظيفة والنقية فيجب استعمال الفلتر وتغير ثلث ماء الحوض كل شهر.

السلوكيات:

هناك ظاهرة فى هذه الأسماك وهى عادة الامتناع عن الطعام على الرغم من التقاط الطعام داخل الفم ولكنها لا تبتلعه بل تقذفه خارج الفم وربما يرجع ذلك إلى نوعية الماء ونظافته.


وللتخلص من هذه الظاهرة يقدم لها ولدة صغيرة من الجوبى.

التمييز بين الذكر والأنثى:

عن طريق بروز عظمة الجبهة عند الذكر مما يصنع زاوية مع امتداد الفك العلوى.

شكل وميل حافة الجسم السفلى والممتدة بين زعنفتى البطن وزعنفة الشرج، ففي الذكر تميل إلى أسفل وتصنع زاوية مقدارها ١٣٥° مع الزعنفة الشرجية أما في الأنثى فهي أفقية وتصنع زاوية مقدارها ٩٠° مع الزعنفة الشرجية وعندما يصل الذكر والأنثى إلى عمر ٩ - ١٠ شهر يكونا صالحين للتفريخ.

أنواع أسماك الانجل:



شكل (٢٩): أسماك الانجل

- الأسود (Black Angel)
- الذهبى (Golden Angel)
- ذات الذيل الطويل (Veil tail Angel)
- الانجل المبقع (Blushing Angel)
- الانجل الوردى (Pink Angel)
- الزبرا ((Zebra Angel)
- البيكلور (ثنائى اللون) (Bicolor Angel)
- بيج تال (Pig tail)

٢ - الديسكس (Symphysodon (Discus

وتنفرد هذه الأنواع بشكل فريد ومميز (شكل القرص) وهى تعيش فى المياه العذبة بنهر الأمازون بأمريكا الجنوبية.

وهى تحتاج فى معيشتها للماء المائل للحمضية والماء اليسر وكذلك المياه ذات المحتوى العضوى. والفم صغير وهو غائر فى الرأس ويبلغ طولها حوالى ١٢ سم.

شروط التربية

المياه:

درجة الحموضة ٦,٥ - ٦,٨.

درجة الحرارة ٢٨ م.

عمق المياه لا يقل عن ٤٥ سم.

تغيير جزء من مياه الحوض ١ - ٢ مرة أسبوعياً.

التغذية:

- الغذاء الحى مثل الدود الحى (الدود الأبيض الأنبوبى).

- الدافنيا - يرقات الناموس - يرقات الجمبرى.

- الأسماك حديثة الولادة (الجوبى - المولى..).

أنواع سمك الديسكس:

البنى - الأزرق - الأحمر - الذهبى.

٣ - بلواكارا - Blue Acara (Aequidens Latifrons)

وهى من الأسماك الجميلة ويجب تربيتها مع الأسماك المماثلة لحجمها أو الكبيرة ويصل طولها إلى ١٥ سم. وتتميز بوجود خطوط عرضية (عدها ٨ - ٩) ونقط زرقاء على الجسم. وهى تقوم بحفر خندق أو حفرة فى الحصى لنقل الصغار إليها ودرجة الحرارة المثلى ٢٢ - ٢٦ م. ويوجد منها البنى.


Family Callichthyidae

جنس كوريدوراس - Genus Corydoras

ومن أشهر أسماكها الكات فيش (Cat-fish) وتتغذى على فتات الطعام بقاع الحوض. وتمتاز بأنها سمكة مدرعة (شكل ٣٠).

صفاتها:


- تحتاج إلى حوض سعته لا تقل عن ٤٥ لتر وينصح بتربيتها مع الأسماك آكلة الطحالب.
- تحتاج إلى ماء قلوى غنى بالكالسيوم ودرجة الحرارة المثلى ٢٣,٥ - ٢٨°م.
- يمكن تفريخها في الحوض ويتميز سلوك التزاوج بالغرابة حيث يدخل الذكر والأنثى في مطاردات طويلة ثم يلتف الذكر على جانبه لى تلتصق به الأنثى وذلك بلسق فمها على بطن الذكر وتخرج ٤ - ٥ بيضات بين زعنفتى البطن ثم يلقحهم الذكر ثم تأخذ الأنثى البيض الملقح وتلتصقه بمادة لزجة على جدار الزجاج بواسطة فمها ويجب فصل الإيوين عن اليرقات بعد فقس البيض (البيض يفقس بعد ٧٢ ساعة إذا توافرت حرارة ٢٣,٥°م) ويتم تغذية الصغار بالغذاء المطحون الذى يترسب على القاع لتلتهمه الصغار.



شكل (٣٠) : الكات فيش (Cat-fish) - Corydoras hastatus


ومن الأنواع الأخرى لهذا الجنس، الأنواع الآتية:

- ١ - كوريدروس بلاتس المنقط وكذلك الأبيض ويصل طولها إلى ٨ سم والأنثى أكبر حجمًا من الذكر وزعنفة الظهر لحمية وتتغذى على فضلات السمك والنباتات بالإضافة إلى الغذاء المجفف (شكل ٣١).



شكل (٣١) : كوريدروس بلاتس - *Corydoras paleatus*

- ٢ - كوريدروس شولتيزي ويصل طولها إلى ٦,٥ سم وزعنفتها الظهرية دهنية وسميكة ولها شوكة عظمية والأنثى أكبر حجمًا من الذكر (شكل ٣٢).



شكل (٣٢) : كوريدروس شولتيزي - *Corydoras schultzei*

عائلة كبرينيدى - Family Cyprinidae
(Gyrinocheilidae, Cobitidae)


جنس الراسبورا

Genus Tanichthys - Genus Raspora

وهى أسماك صغيرة الحجم وتفرخها به صعوبة فهى تحتاج إلى حوض سعته ٢٠ لترًا ويزود بنباتات أوراقها عريضة وخاصة نباتات الأمازون والماء يجب أن يكون حامضياً.


أنواعها:

١ - كلود مونتان الأبيض (White cloud mountain) (شكل ٣٣) يصل طولها إلى ٣,٥ سم والجسم أسطوانى، البطن فضية، والذيل به منطقة حمراء فى منتصفه والزعنفة الظهرية حمراء اللون، واللون العام للجسم لبنى داكن ويوجد خط ذهبى على جانبى الجسم.



شكل (٣٣) : كلود مونتان الأبيض - Tanichthys alonubes

٢ - هارل كوين (Harle quin) وشكلها جميل ولها مثلث أسود على جانبى الجسم يمتد من وسط الجسم حتى نهاية الجسم. اللون وردى فى الجزء الأمامى من الجسم والنصف الخلفى من الجسم يتميز بألوان عديدة مثل قوس قزح (شكل ٣٤).




شكل (٣٤) : سمكة هارل كوين - Raspora heteromorpha

عائلة الشراكيديا Family Characidae

وأشهر أنواعها:

- ١ - أوليجو ليبس (Olig lepis) أو ذات الأعين الحمراء ويصل طولها ١٢ سم ويوجد خط عريض رأسى لونه أسود على الذيل والجسم لونه فضى.
- ٢ - السربيا (Serpae) والجسم مضغوط واللون أحمر شفاف وتتميز بوجود بقعة سوداء على جانبى الجسم خلف الرأس والزعانف لونها رمادى يميل إلى الاحمرار ما عدا الزعنفة الظهرية فاللون أسود (شكل ٣٥).



شكل (٣٥): سمكة السربيا

Hypphessobrycon Callistus

صفاتها:

- درجة الحرارة المثلى ٢٢ - ٢٦°م والماء المائل للوسط الحمضى ويجب أن يحتوى الحوض على نباتات كثيفة.
- التغذية الأساسية الحشرات والديدان.
- حوض التفريخ يجب أن تكون سعته ٦ - ١٠ لتراً وتحتاج إلى نباتات ذات أوراق رفيعة لسهولة وضع البيض عليها ويفقس البيض بعد ٢٤ ساعة ويتم تغذيتهم على بيض الجمبرى والارتميا ويجب تغيير ماء الحوض أسبوعياً.


Family Gasteropelecidae

جنس الكرنجيلا – Genus Carnegiella

ومن أشهرها السمكة ذات الجناح الأسود (Black winged fish) (شكل ٣٦) وقد سميت بهذا الاسم لأن لها أجنحة سوداء. ولها زعانف صدرية ضخمة وبطن كبيرة () وهي تعيش بالقرب من سطح الماء بالحوض ويمكن تربيتها في حوض به نباتات طافية وتفضل براغيث الماء والذباب والدود في غذائها كما يمكن تغذيتها على الغذاء الجاف.

صفاتها:

- يبلغ طولها ٣,٥ سم الأنثى أكبر حجماً من الذكر.
- تقفز لأعلى لتأكل الحشرات.
- درجة حرارة الماء المناسبة لتربيتها ٢٣ – ٣٠°م.
- وتفضل المياه المائلة للوسط الحمضي (٦,٥ – ٦,٩ درجة الأس الأيدروجيني).
- تتغذى على الغذاء الطافي على سطح ماء الحوض.



شكل (٣٦): السمكة ذات الجناح الأسود (Black winged fish)

عائلة بوسيليدا

Family Poecilides

جنس بوسيليا Genus Poecilia


وهى أسماك ولودة تتميز بسهولة تربيتها وتفرخها حيث أنه يمكن وضع الذكر والأنثى فى حوض مفرد به النباتات اللازمة وبمجرد أن تلد الأنثى الصغار يرفع الذكر والأنثى من الحوض ويتم رعاية الصغار.

وتشتمل هذه العائلة على الأنواع الآتية:

١- سمكة الجوبى (Guppy) (شكل ٣٧) - *Poecilia reticulata*

يمكن أن تعيش فى أحواض صغيرة وتحتاج إلى ماء نقى ودرجة الحرارة المثلى هى ٢٥°م وتعطى فى حدود ٦٠ ولدة فى المرة الواحدة وتعطى ولدة كل شهر ويمكن أن تلحق مرة واحدة فتعطى ٣ مرات ولدة بدون تزواج.

تأكل الطعام المجفف والدود الحى - والأسماك لونها مخضر وبعضها لها علامات سوداء على الذيل ومنها اللون الأصفر والأسماك ذو الذيل الأحمر.




شكل (٣٧): سمكة الجوبى

٢- المولى (Mollie) Molly - *Poecilia sphenops*


سمكة عمرها طويل (شكل ٣٨) يصل طولها إلى ١٢ سم والزعنفة الظهرية فى الذكر كبيرة وتشبه الشراع - وتحتاج إلى إضافة الملح إلى ماء الحوض (يضاف حوالى ٥ جم ملح خشن + ١٠ جم ملح ناعم لكل ٤ لتر ماء من الحوض).

الغذاء المفضل هو الغذاء الأخضر مثل الخس المجزأ إلى أجزاء دقيقة - والأنثى سهلة التعرض للإجهاد فيجب أن تنقل فوراً في أول الحمل إلى حوض خاص.


الألوان




تلد مرة كل ٤ أسابيع من ٦٠ إلى ٨٠ ولدة في المرة الواحدة.



شكل (٣٨): سمكة المولي العادية *Poecilia Sphenops*




شكل (٣٩): سمكة المولي شراعية الزعنفة - Sailfin
(*Poecilia latipinna*)



شكل (٤٠): السالفن مولى – *Poecilia Velifera*

والذكور تتشاجر دائما مع بعضها بدون إصابات



شكل (٤١): سمكة المولى السوداء (*Poecilia hybrid* (Black molly))



جنس زيفوفورس

Genus Xiphophorus


١- سورد تال - سيفيه الذيل - Xiphophorus hellerii

الذكر ذو ذيل أشعته السفلية تمتد للخلف وتعطى شكل السيف والأنثى ليس لها سيف الأنثى طولها ١٢ سم والذكر ١٠ سم ومن عاداتها القفز من الحوض فيجب الإقلال من ارتفاع الماء في الحوض

الألوان



شكل (٤٢): سمكة سورد تال العادية




شكل (٤٣): الدوبل (Duble Sword tail)

٢ - أسماك البلاتى (Platy) - *Xiphophotus maculatus*

وموطنها الأصلي المكسيك والأنثى طولها يصل إلى ٧ سم ولونها بنى فاتح مع نقط زرقاء على الجسم ونقط حمراء متفرقة وهى ولادة ومنها أنواع كثيرة حسب الألوان وهى:

- الأحمر (Red wag tail)
- الذهبى ذو الذيل الأسود (Gold wag tail)
- والأحمر فى الأصفر (Sun-set) والأصفر الكنارى وهى أسماك هادئة.




شكل (٤٤): أسماك البلاتى


وهى من الأسماك المعمرة ويمكن أن يصل عمرها إلى أكثر من ٢٠ عامًا وقد يصل طولها إلى ٤٥ سم ونموها وحجمها لا يرتبطا بالسن ولكن يعتمدان على التغذية. ومن أنواعها:

- السمكة الذهبية المنتشرة (Common Gold fish) وهى حمراء أو برتقالية أو صفراء أو سوداء أو بيضاء اللون.
- السمكة ذات الذيل المروحي (Fan tail) والذيل مزدوج على هيئة حرف V وهى تتميز بالحركة البطيئة (٤٥).


- سمكة المسور (Moor fish) وهى ذات أعين تليسكوبية ولونها داكن ويتراوح اللون من البرونزى إلى الأسود الفاحم (شكل ٤٦).
 - سمكة السالستيل (Celestail fish) عيونها تليسكوبية متجهة لأعلى وعينها اليمنى متجهة ناحية اليسار وتهتدى إلى الغذاء عن طريق حاسة الشم (شكل ٤٧).
- وتتميز هذه الأسماك بأنها تحتاج إلى درجة حرارة ١٥ - ٢٥ م ولا تحتاج إلى سخان فى الشتاء.



شكل (٤٥): السمكة مروحية الذيل (Fan tail fish)



شكل (٤٦): سمكة المسور (Moor fish)




شكل (٤٧): سمكة السالستيل (Celestail fish)

عائلة أنا بنتيدي – Family Anabantidae

١ - جنس بيتا - Genus Betta

وأهم أنواعها سمكة سياميس المقاتلة (Siamese fighter) (شكل ٤٨) أو الفيستر وأصلها دولة سيام فهي تستخدم فى المغامرة وذلك بقتال الذكور مع بعضها. والذكر هادئ عندما يكون وحيداً وهو أسطواني الشكل والجسم ويبلغ طوله ٦ سم وله ذيل طويل وكذلك زعنفتى الذيل والشرح والأنثى زعانفها قصيرة وذات بطن عريضة.



شكل (٤٨): سمكة سياميس المقاتلة (Betta splendens)

الذكر يصنع العش وهو من الفقاقيع


٢ - جنس الجرامى

Genus Trichogaster


وهى أسماك هادئة الطبع ويمكن تفريخها بسهولة ودرجة الحرارة المثلى للتفريخ هى ٢٣ - ٢٨ م. وهى تحتاج إلى خيوط نايلون وتعلق على جانب الحوض بالإضافة إلى زرع كثيف بالحوض لتضع عليه البيض ويتم إخصابه.

وأهم أنواعها يمكن شرحها فى هذا الجدول المبسط:

| النوع | صفاته |
|----------------------------------|--|
| • الجرامى القزم Dwar gourami | يصل طول الذكر إلى ٤,٥ سم والأنثى أصغر حجمًا من الذكر وموطنه الأصلي الهند وهو هادئ الطبع ويوجد على جانبيه الجسم خطوط حمراء وزرقاء |
| • الجرامى الأزرق Blue gourami | يصل طوله إلى ١٥ سم ومنه البنسى والسناك (جلد الثعبان) واللؤلؤى (برل جرامى) ويحبذ تربيته فى حوض كبير والجرامى الأزرق لونه أزرق ويوجد نقطتين سوداويتين على كل جانب. أما الجرامى اللؤلؤى فلونه فضى وأثناء التزاوج يغطى جسمه دوائر رمادية (شكل ٥٠). |



شكل (٥٠): الجرامى اللؤلؤى
Trichogasteri – Pearl Gourami



شكل (٤٩): الجرامى الأزرق
T.trichopterus

عائلة كيريندى - Family Cyprinidae


جنس بيونتس الباربي

ومنها الذهبى والوردى (Rosy barb) والمهرج (Clown barb) وتضع الأنثى ٣٠٠-٤٠٠ بيضة وهى تحتاج إلى خيوط نايلون وزرع كثيف للتفريخ.


وأهم أنواع هذه المجموعة ما يلى:

| النوع | صفاته |
|-----------------------------|--|
| • البارب الوردى (شكل ٥١) | لونه فضى والذكر يصبح لونه قرنفلى وقت التزاوج ويصل طوله إلى ٥ سم. |
| • المهرج | يصل طوله إلى ١٢ سم (من ٤ - ١٢ سم) وهى ذهبية اللون والزعانف لونها أحمر |
| • بارب حرف "T" (شكل ٥٢) | يصل طولها إلى ٢٠ سم ولونها فضى وبها خطين رأسيين لونها أسود |
| • البارب الأسود (شكل ٥٣) | يصل طوله إلى ٦ سم وعلى الجانب ثلاثة خطوط عريضة وكل قشرة عليها نقطة ذهبية. |
| • بارب الكريزى | الطول ٥ سم وبها خطان أفقيان: خط أسود يليه خط ذهبى ويصبح لونها كريز وقت التزاوج |
| • البارب النمر (شكل ٥٤) | الأنثى طولها ٥ سم والذكر ٧ سم ومن عاداتهما قرض ذيول الأسماك لذلك تربي وحيدة ولونها ذهبى وبها ٤ خطوط سوداء عريضة وورأسية. |
| • البارب الدما (شكل ٥٥) | الطول ٥ سم والقشور لونها أسود داكن وفاتح والزعانف ذهبية |


| النوع | صفاته |
|---------------|---|
| • بارب أريولس | الجسم أسطوانى ذو زعانف حمراء أو برتقالي وعلى الجسم نقوش سوداء فى الجزء العلوى والأسفل فضى |




شكل (٥٢): بارب حرف T
Barbus lateristriga





شكل (٥١): البارب الوردى
Rosy barb (Barbus Conchonus)



شكل (٥٤): البارب النمر
Barbus hexazona



شكل (٥٣): بارب الأسود
Barbus nigrofasciatus)



شكل (٥٥): البارب الدما والبارب تيكو – Barbus tico و Barbus..


عائلة شراكيدي - Family Characidae

Genus; Hyphessobrycon, Paracheirodon, Cheirodon


أسماك التترا

| تترا بلاك نيون | شعلة النار (فلام تترا) | التترا الليموني (ليمون تترا) | بلاك تترا المخطط |
|---|--|---|---|
| H. herbertaxelrodi | H. Flammeus | H. Pulchripinnis | H. Scholzei |
| طولها ٤,٥ سم والجسم مبطط والذكر أصغر من الأنثى يوجد بطول الجسم خط أسود يعلوه خط أخضر الجزء العلوى من الجسم نحاسى من الأنف حتى الذيل تعيش فى تجمعات منظمة (شكل ٥٦) | طولها ٥ سم، النصف الخلفى من الجسم أحمر وردي ويوجد بطول الجسم خطين لونهما أسود (شكل ٥٧) | عديمة اللون فى الحوض الخالى من النباتات وتتلون فى الحوض الذى يوجد به نباتات | طولها ٨ سم ولونها فضي ويوجد بالجسم خطوط سوداء أفقية وتمتد بطول الجسم (شكل ٥٨) |


وأسماء التترا ليس من السهل تفريخها.



شكل (٥٧) : شعلة النار




شكل (٥٦) : تترا بلاك نيون




Serape tetra (H. Callistus)


التترا السيربي




Rosy tetra – تترا وردى
(Hyphessobrycon rosaceus)



نيون تترا – Neon tetra
(Hyphessobrycon innesi)



بلاك ليند تترا – Black tetra
(H. Scholezei)



تترامشع – Glow light tetra
(H. gracilis)

شكل (٥٨) : أنواع أخرى من التترا

أنواع أخرى من الأسماك لتربيتها:

القرش الأسود ذو الذيل الأحمر (Red tailed shark)


يصل طولها ٢٠ سم واللون أسود والزعنفة الذيلية تتلون بلون أحمر دموي.
والأنثى أكبر حجماً من الذكر وهي سمكة معمرة.

وتحتاج إلى الآتى:

- ١ - درجة حرارة ٢٢ - ٢٦°م.
- ٢ - درجة أس أيدروجيني حوالى ١٠.
- ٣ - التغذية: الدود الحى - براغيث الماء - الغذاء الجاف وأوراق نبات الخس.
- ٤ - تحتاج إلى كهف ونباتات كثيفة.

• القرش ذو الزعانف الحمراء (Red fin shark)

يصل طولها إلى ٨ سم ولها شاربين قصيرين والأنثى ذات بدانة والذكر يمكن تمييزه عن الأنثى وذلك بوجود خط أسود على زعنفة الشرج (شكل ٥٩). ولها نفس احتياجات القرش الأسود ذو الذيل الأحمر.



شكل (٥٩) : القرش ذو الزعانف الحمراء

• بمبل بى (Bumble bea)

سمكة يصل طولها ٥ سم وبها أربعة خطوط رأسية سوداء تتبادل مع خطوط صفراء بيضاء (تشبه الدبور) وهى هادئة وتحتاج إلى درجة حرارة ٢٤ - ٣٠°م (شكل ٦٠).



شكل (٦٠) : سمكة بمبل بى

السمة الشفافة (Glass cat fish)

سمكة طولها ١١ سم وهى تعيش فى مجموعات ثلاثية أو رباعية وهى تفضل التواجد فى ثلثى الحوض العلوى وتتخذ وضع مائل فى الحوض. لا تستطيع العيش إذا أصيب أحد شواربها والزعنفة الظهرية عبارة عن شعاع واحد وليس لها أعضاء تناسلية خارجية. تتغذى على براغيث الماء والطعام الجاف ولا تفرخ بالأحواض.

مجموعات التربية فى الحوض

ولكن بشرط مراعاة الأنواع التى يمكن أن تعيش مع بعضها فى سلام كالتى:
الأسماك الشرسة

الأوسكار Oscar

فير موث شيكلد Fire Mouth Cichlid

كونفبكت شيكلد Convict Cichlid

أوراتس Auratus

زبرا شيكلد Zebra Cichlid

تيجر بارب Tiger Parb

الأسماك التى تربي مع الأسماك الهادئة

الانجل Angel

الديسكس Discus

السمة العلم Flag fish

وكذلك ترجع أهمية تعيين سعة الحوض عند إضافة الأدوية المعالجة للأمراض فى الحوض حيث أنها يجب أن تضاف بتركيزات الموصى بها.

الفصل الثالث

المعاملة الصحية للحوض

وطرق رعاية الأسماك

معاملة الحوض والرعاية الصحية

أولاً: نظافة الحوض

(أ) التقاط الفضلات

- يجب العناية بنظافة الحوض والتقاط الشوائب وفضلات الإخراج أو بقايا الغذاء ويجب أن يتم سحبها كل يومين أو ثلاثة أيام بإحدى الطرق الآتية:

١ - الشفاط (شكل ٦١)

وهو عبارة عن أنبوبة طويلة مفرغة وبها انتفاخ فى طرفها العلوى وتوضع رأسية فوق الفضلات بعد تفريغها جزئياً من الهواء (وذلك بالضغط قليلاً على رأسها) وعند رفع الضغط قليلاً يندفع الماء بها حاملاً الفضلات ويتم التخلص من هذه الفضلات خارج الحوض.

٢ - الكاشطة (شكل ٦٢)

وهى عبارة عن وسادة ذو يد بلاستيكية وهى تشبه مضرب الذباب وتستخدم فى رفع والتقاط الشوائب.

٣ - المكنسة الهوائية


وهى توصل بفتحة الهواء ويوجد بها كيس قماش بالقرب من طرفها العلوى وننتهى بأنبوبة طويلة توضع فى الماء فوق الفضلات لكى تجذبها لأعلى إلى داخل الكيس.

(ب) الزجاج

لتنظيف الحوض من الداخل (سطح الزجاج) يستخدم مغناطيس التنظيف (انظر الشكل ٦).

(ج) تنظيف الفلتر

وذلك بغسل المادة الإسفنجية أو الصوف الزجاجي للفلتر بالماء النظيف الخالي من الكلور أو الصابون.



شكل (٦٣): مغناطيس التنظيف



شكل (٦٢): الكاشطة



شكل (٦١): الشفاط

ثانياً: تغيير ماء الحوض

يتم تغيير ماء الحوض كل ستة أشهر تغييراً كاملاً. وكذلك يتم تغيير $\frac{1}{4}$ ماء الحوض كل ١ - ٢ شهر لتجديد حيوية المياه بالحوض والمحافظة على صحة الأسماك.

خطوات تغيير ماء الحوض:

- تفصل الكهرباء عن الموتور والسخان وكذلك الإضاءة بالحوض.

- ينقل السمك بواسطة الشبكة إلى وعاء نظيف خالى من المنظفات كالصابون أو المواد الضارة الأخرى. وينقل السمك بعد ملئ الوعاء بماء الحوض (قدر كافى من الماء). يزود الوعاء الذى به السمك بوصلة هواء غير قوية لتجنب انقلاب السمك فى الوعاء.
- يفرغ الماء المتبقى بالحوض فى البالوعة مع إبعاد الحصى فى أحد أركان الحوض. يأخذ الحصى ويغسل بالماء والملح فقط ثم يطهر بواسطة وضعه فى محلول مخفف من برمنجنات البوتاسيوم أو الديتول ويشطف بعد ذلك جيدًا عدة مرات. يغسل الحوض من الداخل والخارج بالملح عدة مرات ثم يشطف بالماء النظيف جيدًا (لا يستخدم أى نوع من المنظفات).
- يغسل الفلتر والوصلات والسخان جيدًا ويمكن تظهيره بمحلول مخفف جدًا من برمنجنات البوتاسيوم (مخفف جدًا حتى لا يلون الفلتر) ثم يغسل مرة أخرى بالماء المالح ويشطف جيدًا.

الفصل الرابع

التغذية وأنواع الغذاء

التغذية فى أسماك الزينة

أسماك الزينة يجب أن تتغذى على أنواع مختلفة من الغذاء ولا تقتصر على نوع محدد تحاشياً لعدم إصابة الجهاز الهضمى للأسماك بالأمراض وحتى لا يهاجم الأبوان الصغار وكذلك يجب أن يتنوع الغذاء لمد الأسماك باحتياجاتها من العناصر الغذائية وذلك للنمو والتكاثر ومقاومة الأمراض وكذلك للمحافظة على ألوانها.


والغذاء يجب أن يشتمل على الأنواع الآتية:

● الغذاء المجفف


وهو سهل الاستخدام وذو قيمة غذائية لاحتوائه على العناصر اللازمة للأسماك. ويفضل شراء أنواع مختلفة من الغذاء المجفف وخلطهم جيداً وذلك لضمان توفر جميع العناصر الغذائية. ويجب أن يتوفر فى الغذاء الجاف الشروط الصحية مثل أن يكون جافاً وليس به رطوبة وأن تكون كثافته أقل من كثافة الماء ولا تذوب بسهولة فى الماء وخال من العفن سُمكه يتناسب مع فتحة فم السمكة. ويقدم الطعام مرتين فى اليوم.

أنواع الغذاء المجفف

| المكعبات | المسحوق | الأقراص | الحبيبات | القشور |
|---|--|---|---|----------------------------|
| مكعبات غذائية تلتصق بجانب الحوض بواسطة الضغط عليها وعندما تبلل يظهر منها أجزاء الديدان المجففة فتلتقطها الأسماك | لا يحبذ استعمالها لأنها تفسد ماء الحوض | أقراص لها سطح مقعر يلتصق بزجاج الحوض تحت سطح الماء فيأكل السمك الأجزاء المشبعة بالماء | على شكل حبيبات حمراء اللون مختلفة الأحجام | يجب أن تكون رقيقة في السمك |
| | | | وتوضع بدائرة الإطعام وهي دائرة مصنوعة من البلاستيك ويمكن أن تثبت في الزجاج باستخدام الكاوتش الماص | |



شكل (٦٤): حلقة الغذاء



شكل (٦٥): الدوادة

● الغذاء الحى (شكل ٦٦)

وهو هام جداً للنمو والتكاثر ويجب أن يقدم مرة واحدة أسبوعياً وذلك لإبراز اللون وزيادة الخصوبة.

١ - بيض ويرقات الجمبرى: وهو بيض جمبرى ملقح، على هيئة بودرة ويباع فى المحلات ويجب حفظه فى الثلاجة ويقدم غذاء للأسماك وكذلك يمكن استخدامه للحصول على يرقات الجمبرى وذلك بالطريقة الآتية:


- يوضع ماء خالى من الكلور (غلى الماء وتركه حتى يبرد) فى وعاء زجاجى (برطمان مثلاً) ويضاف إلى الماء ملح رشيدى خشن بمعدل ٢٠ جم/لتر ماء ويزود الوعاء بتهوية صناعية بعد قفله ووضع بيض الجمبرى بالماء ومن ٢ - ٣ يوم يتم فقس البيض وتخرج اليرقات ويمكن جمعها بواسطة شبكة صغيرة مصنوعة من شراب نابليون وتنقل اليرقات ٤ مرات للحوض (اليرقات تموت فى الماء العذب).

٢ - البروتوزوا أو الانفوزوريا (الكائنات الدقيقة): ويمكن تحضيرها لغذاء الزريعة والأسماك الصغيرة وتحضر بالطريقة الآتية:

- يملأ وعاء زجاجي (برطمان زجاجي) بماء الحوض ثم يوضع في هذا الوعاء جزء من طمي الحديقة وكذلك المواد الآتية: قطعة من ورق الخس مجزأ إلى أجزاء دقيقة + ملعقة صغيرة من البن + قطعة صغيرة من قشر الموز.

- يمد الوعاء بالتهوية الصناعية لمدة ثلاثة أيام.

- تقدم الحيوانات الدقيقة عن طريق خرطوم بلاستيك توضع نهايته بالحوض ويتم تنقيط مياه البرطمان بقطارة ليتم التقاطها بواسطة الأسماك بمجرد خروجها.




شكل (٦٦): التغذية على اليرقات الدقيقة (البرتوزوا) وهي ترى بالمجهر أو عدسة مكبرة

٣ - الديدان البيضاء الحية والأنبوبية: يمكن الحصول عليها من المحلات التجارية لأسماك الزينة وتوضع فى الدوارة (انظر الشكل) وتلصق على جانب الحوض بواسطة الكاوتش الماص. وتقدم مرة كل أسبوع.

٤ - أغذية أخرى (مثل الكبد وصفار البيض المسلوق): يفرم صفار البيض أو الكبد بعد غليه لبضع دقائق ويقدم بكميات ضئيلة على فترات وذلك لتحاشي تعكر ماء الحوض.

شروط تقديم الغذاء:

- ١ - تغذى الأسماك مرتين يومياً فى ساعات محددة.
- ٢ - يفضل إيقاف التهوية حتى لا يترسب الغذاء بالقاع.
- ٣ - كمية الطعام يجب أن تكون محددة ولا يسرف فيه ويقدم الغذاء على دفعات ويجب وقف الإطعام عند شبع السمك (يمكن معرفة ذلك عندما تقرب يدك إلى الحوض بالقرب من سطح الماء فإذا أسرع السمك إلى يدك فذلك يدل على الجوع).
- ٤ - يجب المحافظة على نظافة الماء وعدم تلوثه بزيادة مرات وكميات الغذاء.
- ٥ - لا يطعم السمك قبل النوم حتى لا تبقى الفضلات الناتجة عن الغذاء.



شكل (٦٧): الطريقة الصحيحة لمسك الأسماك من الحوض بواسطة الشبكة

الفصل الخامس

أهم الأمراض التي تصيب أسماك الزينة وطرق الوقاية منها والعلاج

أعراض ظهور المرض على الأسماك

- ١ - فقدان الشهية أو ظهور حركات غير طبيعية على الزعانف أو ببطء الحركة.
- ٢ - ظهور إصابات على الفم أو الخياشيم أو جسم السمكة والزعانف.
- ٣ - اهتزاز الأسماك وتأرجحها في الحوض مع فقدان التوازن أو الانقلاب على الأجناب وصعوبة التنفس (كثرة فتح الفم وغطاء الخياشيم).
- ٤ - ظهور الأسماك تحت الماء مباشرة أو انفرادها في الجزء العلوى من الحوض على الجانب.
- ٥ - اعتكاف الأسماك بأحد أركان الحوض بالقرب من القاع.
- ٦ - ظهور حالات نفوق في الأسماك.
- ٧ - تلوث مياه الحوض ببقايا الغذاء المتعفن.

الوقاية من الأمراض

لتجنب الأمراض التي تنشأ عن الفطريات والبكتريا والطفيليات يجب مراعاة الآتى:

- عدم ازدحام الحوض بالأسماك ومراعاة المساحة المتاحة لكل سمكة.
- عدم تربية الأسماك الشرسة مثل الأوسكار الفيروموت زبرا شيكلد والتيجر يارب مع الأنواع الهادئة.

- يجب توافر البيئة المناسبة للماء وأهمها :
 - ١ - درجة الأس الأيدروجيني PH.
 - ٢ - درجة الحرارة (يجب الحذر من التغير المفاجئ في درجة الحرارة وذلك بنقل السمك من ماء دافئ إلى بارد والعكس).
 - ٣ - عسر الماء والملوحة.
 - ٤ - الأوكسجين الذائب : يجب تحاشي نقص الأوكسجين الناتج عن سوء استخدام الموتور وعدم وجود نباتات وتحاشي الإسراف في الغذاء.
- العناية بنظافة الحوض الأسبوعية والشهرية.
- التأقلم التدريجي للأسماك عند وضعها في الماء سواء بعد الشراء أو أثناء غسل الحوض.
- عدم إضافة أسماك مشتراة ووضعها مباشرة مع الأسماك في الحوض. فلابد من وضعها لوحدها لمدة ٤٨ ساعة حتى يتم التأكد من عدم ظهور أمراض عليها ثم نغطس في محلول أزرق الميثيلين قبل وضعها مع الأسماك وذلك لعدم نقل الأمراض منها إلى الأسماك السليمة.
- العناية بالنبات داخل الحوض وتجنب ضموه.
- ويجب إضافة مادة فلورامين للماء لإعطاء الحيوية للنباتات وكذلك الأسماك.
- خلو الماء من أى آثار للصابون أو المنظفات أو الكلور لأنها تؤثر على الخياشيم والجلد وتزيد من الإصابة بالأمراض في الأسماك وكذلك تعتبر مواد قاتلة للأسماك.
- تجنب رش المبيدات الحشرية المنزلية قبل تغطية الحوض وإيقاف الموتور.
- تجنب حيوان الهيدرا ومعالجتها بكبريتات النحاس بتركيز ١ ملجم كبريتات نحاس لكل لتر من الماء والحوض خال من الأسماك.
- عند ظهور البراز على هيئة خيط طويل يخرج من السمكة فهذا يعنى «إمساك» ويجب علاجه فوراً وذلك بإضافة ٤ - ٥ جم من ملح كبريتات الماغنسيوم إلى الحوض المتوسط الحجم أو ٨ - ١٠ جم بالنسبة للحوض الكبير الحجم على أن يكرر مرة أخرى بعد حوالى شهر.

كيفية التصرف عند ظهور المرض

فى حوض التربية

إن اكتشاف الأمراض فى بداية حدوثها يعتبر أمر هام فى سرعة القضاء عليها والمحافظة على صحة الأسماك وعدم تفشى المرض ومسبباته فعند ظهور أى عرض من هذه الأعراض يجب اتخاذ الخطوات الصحية التالية:

• إزالة الأسماك النافقة فوراً من حوض التربية فى وعاء زجاجى (طبق بترى) و لوح زجاجى موضوع عليه ورقة ترشيح بيضاء ومحاولة معرفة المرض عن طريق مشاهدة الفم من الخارج أو الزعانف وملاحظة أى تغييرات على جسم السمكة النافقة فهذا يساعد على تشخيص المرض فى أحوال كثيرة ويجرى الفحص بعد رفع الأسماك الحية التى عليها أعراض مرضية.

• الأسماك المريضة ترفع وتبعد عن الحوض وتوضع فى حوض آخر به مياه لها نفس درجة حرارة ماء الحوض السابق ونفس درجة الأس الهيدروجينى ومزودة بتهوية جيدة ويتم معالجة الأسماك المريضة حسب نوع المرض وطريقة العلاج فمثلا فى حالة الإصابة بالفطريات وأمراض تآكل الزعانف تعالج الأسماك بوضعها فى حوض العلاج أو التغطيس وذلك بإحدى الطرق الآتية:

١ - التغطيس لمدة ٣ - ١٠ دقائق فى محلول أزرق الميثيلين (٥٪) بوضع $\frac{1}{4}$ سم من هذا المحلول لكل ٣,٨ لتر ماء.

٢ - التغطيس لمدة ٥ دقائق فى محلول عبارة عن ٤ لتر ماء مضاف إليها ٢ سم ميركروكروم.

٣ - التغطيس فى محلول الفورمالين (١ سم^٣ فورمالين لكل ١٠٠ سم^٣ من الماء، لمدة ٣ دقائق.

ثم تنقل الأسماك بعد ذلك إلى حوض العزل والعلاج ويقدم للأسماك تتراميد يكاتدفود (يحتوى على مضادات فطريات وبكتريا) لمدة ٧ - ١٠ أيام. وبعد الشفاء تنقل إلى أحواض التربية.

- حوض التربية الذى ظهر به المرض يضاف إليه ١ سم^٣ من محلول المثلين الأزرق (تركيزه ٥٪) ويزود بتهوية جيدة ودرجة حرارة مناسبة.
- أما إذا كانت الأسماك المريضة مصابة بالديدان الخطافية أو ديدان الجلد فيجب عمل حمام مائى لها عبارة عن محلول به ملح رشيد بمعدل ٢٠ جم ملح رشيد تذاب فى كل لتر ماء وتوضع الأسماك المصابة به لمدة ١٥ دقيقة.
- قبل نقل الأسماك المريضة التى تم شفائها من حوض العلاج إلى حوض التربية يجب إعطائها قليل من خميرة البيرة المسحوقة لاستفادة البكتيريا النافعة داخل جهازها الهضمى ويفضل أثناء العلاج بالمضادات الحيوية.

أهم أمراض الأسماك وطرق العلاج

| المرض | المسبب |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • بروز العين إلى الخارج • ظهور بقع بنيه اللون • بروز القشور بهتان اللون - ازدياد سرعة التنفس - بطء الحركة ويشل الذيل وتبقى السمكة فى جانب الحوض من أعلى. | <p>بكتريا وطفيليات تنقل الأسماك إلى حوض به ماء نظيف بعد معالجتها:</p> <p>١ - تغطيس الأسماك بواسطة شبكة فى محلول من الفورمالين ١ سم^٣ فورمالين + ١٠٠ سم^٣ ماء أو ٥ نقط مثيلين أزرق (٥٪) لكل ٣,٨ لتر ماء والتغطيس لمدة ٣ دقائق.</p> <p>٢ - إعطاء Tetra medicated food لمدة ٧ - ١٠ أيام</p> <p>فطريات وبكتريا.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • فطر الفم حيث يبدو الفم مهترًا ومغطى بما يشبه زغب القطن. • فطر الجسم حيث تظهر بطش ذو ملمس قطن. • فطر العين حيث تظهر العين كأنها مغطاة برغوة بيضاء تتحول إلى شكل قطن | <p>١ - تنقل الأسماك إلى حوض به ماء نظيف يحتوى على ١٪ ثنائى كرومات البوتاسيوم (١٠ ملجم من ثنائى كرومات البوتاسيوم لكل ٧,٥ جالون ماء) بعد تغطيسها فى محلول مثيلين أزرق كما سبق.</p> <p>٢ - تعطى Tetra fungi or medicated food bacterial لمدة ٧ - ١٠ أيام أو مستحضر فانجى ستوب بوضع ٥ سم^٣/لتر من مياه الحوض.</p> <p>٣ - بعد أسبوع تنقل إلى ماء نظيف.</p> <p>٤ - يراعى التهوية الجيدة وضبط معدلات الحرارة.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>تعالج الأسماك كالاتى :</p> <p>١ - تغطس الأسماك فى محلول ١٠ ملجم أورميسين + ٢ لتر ماء لمدة ٥ دقائق.</p> <p>٢ - تنقل إلى حوض به ماء مضاف إليه ٥٠٠ ملجم أورميسين لكل ٣,٨ لتر ماء.</p> <p>٣ - إعطاء تيترا ميدكيت فودباكتريال لمدة ٧ - ١٠ أيام بمعدل ٥ سم^٢ / لتر من ماء الحوض.</p> | <p>• تأكل الذيل والزعانف</p> |
| <p>١ - رفع درجة حرارة الماء إلى ٢٩م°.</p> <p>٢ - إعطاء الأسماك أنتى هويت سبوت Amti white spot.</p> | <p>النقط البيضاء (المسبب طفيل)</p> <p>مناطق بيضاء ثم نقط بيضاء على زعانف وجلد وعين الأسماك مع فقدان للشهية - انتفاخ فى البطن تكون براز سميك على الجسم والزعانف بطة حركة السمكة وارتخاء الزعانف وخاصة زعنفة الظهر وتموت السمكة تدريجياً.</p> |
| <p>نفس العلاج السابق أو التغطيس فى محول فورمالين أو أزرق الميثيلين.</p> | <p>مرض القطيفة velvet disease</p> <p>نقط بيضاء لها مظهر قطيفى تظهر على الجسم (كأنها حبيبات بودرة) مع صعوبة التنفس لإصابة الخياشيم.</p> |
| <p>حمام (تغطيس) لمدة ٣٠ دقيقة فى محلول ٣,٥٪ ملح ويكرر كل يومين أو يستعمل محلول الساليكس.</p> | <p>مرض الجلد اللزج</p> <p>تفرز من الجسم مادة لزجة وتفقد السمكة لونها وتصير شاحبة</p> |
| <p>ستريوميسين ١٠ كبسولات، حمض بارا امنيو ساليسلك ١٠ حباب / ٣,٨ لتر من ماء الحوض وتغطس الأسماك لمدة ٣ ساعات ثم تنقل إلى حوض به ماء نظيف.</p> | <p>السل</p> <p>ظهور نقط صفراء على الزعنفة الظهرية مع فقدان الشهية - نقص وزن السمكة وبطة فى الحركة.</p> |

| | | |
|--|---|---|
| <p>حمامات للأسماك في محلول مكون من ٢٠سم^٢ من حمض البكريك (١ جرام حمض بكريك + ١٠٠سم^٢ ماء) يضاف إلى ٣,٨ لتر ماء، تغطيس الأسماك يتم لمدة ساعة ثم ينقل إلى حوض به ماء نظيف.</p> | <p>نقط سوداء أو بنية اللون عبارة عن أكياس لها ديدان طبقات مخاطية على الخياشيم واحتقانها وبزور الفم للأمام</p> | <p>النقط السوداء</p> <p>ديدان الخياشيم والجلد الماصة (واكتيوجيروس وجيرو د اکتیلوس</p> |
|--|---|---|

الفصل السادس

التفريخ فى أسماك الزينة

يمكن تفريخ أسماك الزينة فى العام الثانى من العمر مع توفر الغذاء الجيد والظروف البيئية المناسبة لتربية الأسماك.

وعادة يكون موسم التفريخ هو موسم الربيع حيث يكون النهار أطول ودرجة الحرارة مناسبة ووفرة الغذاء.

فى موسم التزاوج أو التفريخ يراعى الآتى :

- زيادة عدد وجبات الغذاء إلى ثلاثة وجبات يوميًا وكذلك إعطاء وجبة من الديدان الحية مرتين كل أسبوع (ولكن يجب مراعاة خواص ماء الحوض وتجنب فسادها).
- فترة إنارة الحوض يجب أن تزيد وخاصة عند إعطاء الغذاء للأسماك.
- يمكن رفع درجة الحرارة ٥°م للوصول إلى درجة الحرارة المثلى للتكاثر لحث الأسماك على التكاثر ونضج المناسل (درجة الحرارة المثلى ٢٢ - ٢٦°م).
- إعداد الحوض للتفريخ حسب احتياجات كل نوع وتضع الأنثى حوالى ١٠٠٠ - ٥٠٠٠ بيضة فى المرة الواحدة فى معظم الأنواع.

التزاوج الطبيعى داخل الحوض

يفضل التزاوج الطبيعى بتوفير سبل التزاوج داخل الحوض ويجب مراعاة النقاط الآتية :

١ - التمييز بين الذكر والأنثى : بالرغم من صعوبة التمييز بين الذكر والأنثى فى أغلب الأنواع إلا أنه يمكن الاعتماد على مظاهر معينة مثل : - استدارة بطن الأنثى وانتفاخها من جانب أكثر من الجانب الآخر. وذلك بالنظر إلى السمكة من أعلى - فى موسم التفريخ تظهر نتوءات بيضاء فوق الخياشيم والزعنفة الظهرية للذكر.

٢ - يتعقب الذكر الأنثى فى كل مكان بالحوض ويزداد هذا النشاط تدريجياً وتبدأ مداعبات بين الذكر وأنثاه (مثل لكم بطن الأنثى برأسه).

٣ - اختيار الذكر والأنثى داخل الحوض وفصلهما عن باقى الحوض وذلك بوضع حاجز زجاجى رأسى أو نقلهما لحوض التفريخ المعد لذلك كما سبق حتى يتم التزاوج وإخصاب البيض. فالأنثى تضع البيض على القاع أو النباتات ويقذف الذكر بالسائل الذكري فى الماء فوق البيض فيلقحه ويخصبه، بعد ذلك يفصل الأبوين عن الحوض.

تغذية الصغار بعد الفقس

فى غضون أيام قليلة يفقس البيض وتخرج اليرقات ويجب إعداد غذاء مناسب لها للتغذية فى أيامها الأولى والغذاء المناسب هو:

١- الطحالب

والطحالب خضراء اللون يمكن إكثارها بتعريض وعاء زجاجى (برطمان) لأشعة الشمس لمدة يومين يحتوى على ماء من الحوض فعندما تنمو الطحالب يتلون ماء البرطمان باللون الأخضر وتتغذى الصغار بإضافة محتويات هذا البرطمان لماء الحوض الذى به الصغار بمعدل مرتين يومياً. وتتم التغذية حتى اليوم الرابع من عمر الصغار ثم تتم تغذيتها بعد ذلك على البروتوزوا أو الحيوانات المجهرية وتسمى "Infusora".

وتتم التغذية على البروتوزوا لمدة أسبوع.

ويتم تحضيرها بالطريقة الآتية :

١ - تقطع وريقات من نبات الخس إلى قطع صغيرة وتوضع فى وعاء زجاجى (برطمان زجاجى) ثم يملأ بماء الحوض حتى ربعه ثم يترك فى مكان معرض لأشعة الشمس الغير مباشرة لمدة ٢٤ ساعة.

٢ - بعد ذلك يتم تصفية المحتويات بمصفاة دقيقة وتضاف المحتويات إلى ماء حوض التفريخ كلها يومياً.


٣ - التغذية على بيض الجمبرى أو الديدان الرفيعة.

عملية التفريخ

(يمكن تقسيم الأسماك من حيث التكاثر والتفريخ إلى قسمين)

وهما :

| الأسماك البويضة | أسماك ولودة |
|--|---|
| <p>فى موسم التزاوج تخرج الأنثى البيض إلى الماء ثم يقذف عليه الذكر السائل المنوى حتى يخصب وتقوم الأنثى وربما الذكر معها برعاية البيض وذلك فى أنواع قليلة من الأسماك بينما فى أغلب الأنواع يفقس البيض بدون رعاية وتخرج منه الزريعة ويكون لها كيس مح تتغذى عليه لمدة ثلاثة أيام</p> | <p>ويقصد بها أن الإناث تخزن البيض الملقح داخلها بعد تلقيح الذكر لها (تلقيح داخلى) بواسطة عضو خاص وبعد فترة يفقس البيض داخل قناة المبيض فى الأنثى وتخرج الزريعة من فتحة قناة المبيض وتسبح فى الماء مباشرة.</p> |
| <p>التفريخ</p> <p>يجهز حوض التفريخ بحيث يشتمل على نباتات ومقاس حوض التفريخ $40 \times 30 \times 60$ سم للأسماك الصغيرة الحجم ينما الكبيرة الحجم فمقاس الحوض $40 \times 30 \times 80$ سم. ويوضع الذكر والأنثى حتى تلقيح البيض وإخصابه ثم يرفع الأبوين من حوض التفريخ ويمد الحوض بالهواء ودرجة الحرارة المناسبة حتى يفقس وبعد ثلاثة أيام من الفقس يبدأ برنامج الرعاية والتغذية.</p> | <p>التفريخ (شكل ٦٨)</p> <p>توضع الأنثى الحاملة فى حوض التفريخ وهو حوض مقاييسه $40 \times 30 \times 30$ سم مزود بلوح من البلاستيك على هيئة سدائب طولية بينها مسافات حوالى ٢ سم ويوضع لوح البلاستيك فوق قاع الحوض بمسافة ١٠ سم.</p> <p>وكذلك لوح من البلاستيك المصمت (أقل ملليمترات من عرض الحوض) وذلك لوضعه رأسياً لفصل الأم عن باقى الحوض حتى تضع الولادة فى مكان محدد من قاع الحوض. ويمد الحوض بالهواء وسخان مناسب وكذلك ترمومتر لتهيئة الظروف. والأم التى على وشك الولادة تكون بطنها منتفخة وفى بعض الأحيان يشاهد بقع سوداء أسفل البطن. بعد أن تلد الأم وتنزل الولادة أسفل الحاجز الأفقى (اللوح البلاستيك) تزال الأم من الحوض وكذلك الحاجز الرأسى ويبدأ الاعتناء ورعاية الصغار حتى عمر شهرين.</p> |



شكل (٦٨): حوض البيض

الاحتياطات التى يجب مراعاتها فى حوض التفريخ:

- معرفة سلوكيات التكاثر فى الأسماك وطباعها وخاصة أثناء موسم التزاوج والتكاثر.
- توفير الظروف البيئية للتكاثر وأهمها درجات الحرارة المناسبة ودرجة الأس الأيدروجينى والأكسجين المناسب وعدم إجهاد الأسماك وتوفير المياه النظيفة.
- فى حوض التفريخ يوضع مرشح هوائى بسيط بإسفنجة حتى لا يهدر البيض أو الزريعة (تيار خفيف من الهواء بالحوض).

- قبل زراعة النبات في حوض التفريخ يجب معاملته للتخلص من الطفيليات التي تضر أو تؤذي الزريعة وذلك بغمره في محلول لتر يحتوى على ٥ جم شبة لمدة دقيقتين.
- تغذية الزريعة بالحيوانات الدقيقة وبيض الجمبرى حتى اليوم العاشر ثم على يرقات الجمبرى من اليوم العاشر حتى الثامن عشر. وبعد ذلك على الديدان.

الظروف المثلى لحوض التفريخ

الحرارة : ٢٤ - ٢٨ م°

الأس الأيدروجينى : ٦,٥ - ٧

العسر : ٥٠ - ١٥٠ جزء فى المليون يعبر عنها كاربونات كالسيوم

الملوحة : لا تزيد من واحد فى الألف

تفريخ أسماك الانجل

وضع البيض:

يفضل هذا النوع وضع البيض فى الأماكن الرأسية مثل أوراق النبات والنصف العلوى من زجاج الحوض. وقبل وضع البيض يقوم الذكر والأنثى بتنظيف مكان وضع البيض بفمهما لضمان التصاقه. وتقوم الأنثى بوضع البيض عن طريق ظهور أنبوبة البيض ويصل طولها ١,٥ سم. وبعد وضع البيض يقوم الذكر بالمرور فوق البيض ويطلق السائل المنوى عدة مرات من أنبوبة الإخصاب التى تمتد من بطنه. ويقوم الذكر والأنثى برعاية البيض وذلك بتهويته عن طريق زعنفتى الصدر لعمل تيار ماء فوقه وينظمانه. ولكى يتم التزاوج ووضع البيض والإخصاب يتم اختيار ذكر وأنثى ويوضعان وحدهما للتزاوج ووضع البيض ويفضل زراعة نبات الأميزون الأوراق العريضة فى الحوض لوضع البيض (تضع الأنثى حوالى ٢٠٠ بيضة) وتبيض مرة كل ١٣ يوم.

التفريخ:

ينقل البيض (أوراق الأميزون التى عليها البيض) إلى حوض الصغار (الذى يجب تطهيره جيداً قبل نقل البيض) مع التهوية المستمرة ولكن ببطء شديد. ويزال البيض الميت يومياً بواسطة شفاعة صغيرة حتى لا يكون وسطاً مناسباً لنمو وانتشار الفطريات التى تفتك بالبيض.

ويفقس البيض بعد ٢٤ ساعة وتخرج الصغار (يرقات طولها ٤ مم) وتتغذى على كيس المح لمدة ثلاثة أيام وتتغذى اليرقات بواسطة الانفيزوريا وبعد ١٥ يوماً يقدم للصغار الطعام الخفيف وكذلك الدود يوم بعد يوم.

تفريخ السمكة الذهبية

- يتم اختيار أبوين (أنثى وذكر) منسجمين ومناسبين لبعضهما ثم يزال باقى السمك من الحوض إلى حوض آخر - يوضع نباتات طبيعية أو صناعية فى قاع الحوض أو ليف نايلون مفكك ومعلق على جانب الحوض بواسطة مشبك - يتم جعل ارتفاع الماء فى الحوض إلى ١٥ سم.
- يبدأ الذكر فى ملاحظة الأنثى والضغط على بطنها برأسه فيندفع البيض من الأنثى على القاع أو النبات أو الليف النايلون فيقذف الذكر بالسائل المنوى فيتم تلقيح وإخصاب البيض (تمتص البويضات الماء فيزداد حجمها إلى الضعف) ثم يزال الأبوين. والأنثى تضع ١٠٠٠ - ٥٠٠٠ بيضة فى المرة الواحدة.
- ويتم فقس البيض فى مدة تتراوح من ٣ - ٨ أيام وبها كيس مح يغذيها لفترة يومين - يتم رفع حرارة ماء الحوض إلى ٢٥°م - رفع عمق الماء ٢٤ سم.
- تغذى الصغار على الطحالب المعدة قبل الفقس بطريقة خاصة وكذلك الانفيزوريا (بروتوزوا ذات أهداب).

الديسكس

وهذه الأسماك تحتاج إلى مياه عذبة يُسر ويفضل أن تكون مائلة للوسط الحمضي.

تفضل هذه الأنواع في غذائها الدود الحى (بعد غسله عدة مرات) والدافينا ويرقات الجمبرى وأسماك الجوبى والأغذية الجافة في هيئة قشور رقيقة. يتغذى مرتين يوميًا. كذلك يفضل استخدام الفلتر الأرضى لمعيشة هذه الأنواع.

أنواعه:

يوجد البنى والأزرق والذهبي والأحمر.

التفريخ:

يجب أن يربى فى أحواض لا يقل عمقها عن ٤٥سم ويتم وضع ٦ أفراد معًا وذلك لاختيار الذكر والأنثى فهذا النوع يتواجد فى زوجين ذكر وأنثى.


ينقل الذكر والأنثى فى حوض التفريخ ويجب أن يحتوى الحوض على نباتات صناعية وقطع من الصخر.

بعد أن يتزاوج الذكر والأنثى يفقس البيض بعد حوالى ٦٠ ساعة وتتغذى الصغار فى الأيام الأولى على إفرازات وخلايا جسم الأبوين. وبعد ثلاثة أسابيع تفصل الآباء والأمهات عن الصغار ويبدأ فى تغذية الصغار على يرقات الجمبرى.

الفصل السابع

تربية ورعاية السلاحف المائية

السلاحف البالغة يفضل تربيتها منفردة فى أحواض زجاجية ذات سعة كبيرة والحوض يجب أن يكون مستطيل الشكل كما يجب أن يفرش الحوض بالحصى وكذلك الزلط النظيف كما يجب إضافة كمية ضئيلة من الرمل إلى قاع الحوض. يفضل استخدام النباتات المائية كبيرة الحجم لغرسها فى الحوض. ويفضل عمل تدرج فى قاع الحوض ويكون مائلاً على هيئة درجات (كما بالشكل ٦٩). وذلك لإعطائها الفرصة للراحة وعدم الإجهاد.




شكل (٦٩): حوض التربية المزود بالمعدات اللازمة

رعاية تربية السلاحف الصغيرة العمر والحجم: (شكل ٧٠)

يفضل تربية صغار السلاحف والتي لا يزيد طولها عن ٦ سم (طول القوقعة) مع أسماك الزينة ولكن فى الأحواض ذات السعة الكبيرة. ويمكن تربيتها منفردة.

ويجب أن يزود حوض التربية بقطعة من الفلين أو الخشب المثبتة بجدار الحوض من الداخل حتى تتمكن السلاحف من التسلق عليها. (شكل ٧٠).

وإذا ربيت منفردة فيمكن تهيئة أحواض $50 \times 30 \times 15$ سم وسمك الزجاج ٤ مم ويوضع فى القاع الحص ويدرج بحيث يكون به جزء أعلى من مستوى الماء. وعامة مستوى الماء فى الحوض يجب أن يكون قليلاً (انظر الشكل).



شكل (٧٠): حوض التربية

أنواع سلاحف الماء العذب والتغذية

١ - السلحفاة المكنة Stinkpot musk turtle:

السلاحف البالغة يصل طولها إلى ٣ - ٤ بوصة وهى داكنة اللون والرأس قصيرة غير ممتدة وكذلك الأرجل قصيرة وغذائها المفضل الحشرات والمواد النباتية.

٢ - سلحفاة الطمى Mud turtle:

وتتميز بأن الرأس متوسطة الطول وتمدها خارج القوقعة والسلحفاة البالغة يصل طولها إلى أربعة بوصات.

والغذاء الرئيسى لها الحشرات والحيوانات الصغيرة.

٣ - السلحفاة المزركشة Painted turtle :

طولها يصل إلى ٥ - ٦ بوصة والقوقعة مفلطحة وملساء ويوجد خطوط جميلة حمراء اللون ومزركشة على الحواف الخارجية للقوقعة والأطراف وكذلك توجد خطوط صفراء على الرأس والبطن ولونها أخضر.

تتغذى على المواد النباتية وكذلك الحيوانات الصغيرة الحية والميتة.

٤ - السلحفاة ذات الغطاء الأملس Soft shell turtle :

وهى مفلطحة الشكل والغطاء العلوى مغطى بطبقة جلدية ناعمة ولها رقبة طويلة تشبه رقبة الثعبان وطولها يصل إلى ١٢ بوصة وهى من النوع الذى يعرض وغذائها الأساسى المواد النباتية.

٥ - السلحفاة النهاشة Snapping turtle :

طولها يصل إلى ١٠ - ١٢ بوصة وتزن حوالى ٣٥ رطل ولها رأس كبيرة وذيل طويل وتتغذى على النباتات والحيوانات.

٦ - سلحفاة البرك الغربية Western pond :

طولها يصل إلى ٦ بوصات والقوقعة داكنة جداً مع وجود بقع صفراء اللون على القوقعة والبطن صفراء اللون. تتغذى على الحيوانات الصغيرة وبعض النباتات.

٧ - السلحفاة المنقطة Spotted turtle :

طولها يصل إلى ٣ - ٥ بوصة وتوجد على القوقعة نقط صفراء وخطوط حمراء على الرقبة والأطراف الخلفية. غذائها الأساسى الحشرات والحيوانات الصغيرة. وهى تحتاج إلى الشمس فى بعض الفترات.

٨ - السلحفاة المنزلقة Cooters and Sliders :

تتغذى على النباتات وطولها يصل إلى ١٢ بوصة وتتميز بوجود بقع حمراء أو صفراء أو الاثنين خلف العين.

الفك السفلى مفلطح وعريض. يوجد خطوط صفراء وحمراء اللون على الرأس والفك.

أما بالنسبة لنوع Cooters فالفك دائري ويوجد خطوط ملونة على الرأس وأسفل القوقعة.

التغذية:

تتغذى على النباتات الخضراء مثل الخس (يجب تقطيعه إلى أجزاء صغيرة) كما يمكن إطعامها بالدود المجفف أو الدود الحى.

الأمراض التى تصيب السلاحف وطرق علاجها:

هناك العديد من البكتيريا والفطريات التى تصيب السلاحف المائية وتسبب حدوث الأمراض والنفوق وهى كالاتى:

البكتيريا الممرضة:

• بكتيريا المجموعة القولونية Coliform bacteria

• الايرومونات Aeromonas hydrophila

• عصويات أنواع من السل Mycobacterium sp.

• السالمونيلا Salmonella sp.

• السودوموناس Pseudomonas sp.

• البكتيريا الواوية Vibrio sp.

• البكتيريا السبحية Streptococcus sp.

(محللة الدم)

• السيتوفاجا Cytophaga sp.

• الفلافو بكتيريا Flavobacterium sp.

الفطريات الممرضة:

- البنسليوم Penicillium sp.
- الفيوزيريوم Fusarium sp.
- الرودوتورلا Rhodotorulla sp.
- الباسيلومايسيس Paecilomyces sp.

والأمراض الناتجة عن البكتيريا والفطريات هي:

١ - التهاب مجرى الأنف الشديد.

٢ - الالتهاب الرئوى والشعب الهوائية.

وتؤدى هذه الأمراض إلى صعوبة التنفس والاختناق والموت.

ويمكن معرفة هذه الأمراض من ملاحظة رشح أو مواد متجينة صفراء على فتحتا الأنف وكذلك صعوبة التنفس والامتناع عن الطعام والخمول والحركة البطيئة.

العلاج (تستخدم العقاقير والأدوية البشرية) :

- إعطاء مضاد حيوى عن طريق الفم مثل: كلورا مفينيكول بمعدل ٥ ملجم مادة فعالة / ١٠٠ جم من وزن الجسم جرعة أولى فى اليوم الأول. يعطى ابتداء من اليوم الثانى ولمدة ٥ - ٧ أيام جرعة يومية ٢,٥ ملجم/١٠٠ جم من وزن الجسم.
- أو يمكن إعطاء تيراميسين أو أوراميسين أو تتراسيكلين بالحقن بمعدل ١,٥ ملجم لكل ١٠٠ جم من وزن الجسم يومياً لمدة ٣ أيام.
- إزالة المواد المتجينة بواسطة قطعة من القطن المبللة والتي تحتوى على ميركروكروم.

٣ - تعفن الفم Mouth-rot تعالج بالتيراميسين.

٤ - الإصابات المعوية مثل الإسهال: وتعالج بالكلورا مفينيكول كما سبق عن طريق الفم.. وكذلك إعطاء معلق فلاجيل بمعدل ٠,١ سم^٢ لكل ١٠٠ جم من وزن الجسم

٥ - الإصابات الجلدية نتيجة الفطريات والبكتيريا وتظهر على شكل تقرحات وإلتهابات وتآكل فى الجلد. وتعالج بالآتى:

• المس لهذه الإصابات باستخدام قطعة من القطن المبللة بمحلول أخضر ملاكبت أو محلول اليود المجفف أو عمل حمامات كما فى الأسماك (انظر الأسماك) لمدة ٥ أيام.

• إعطاء مضاد حيوى بالحقن مثل تتراسيكلين فى العضل جرعة واحدة (٤ ملجم / ١٠٠ جم من وزن الجسم).

٦ - التهاب العين والجفون : المس أو قطرة الإنسان وتقطر فى العين لمدة ٣ أيام بمعدل ١ - ٢ فى اليوم.

الإصابة بالديدان المعوية:

هناك الكثير من الديدان (المفلطحة - الأسطوانية - الشريطية) التى تصيب الأمعاء والقلب والجهاز الدورى.

وتسبب النفوق والهزال وينصح قبل التربية فى الأحواض بإعطاء الجرعات الآتية:

١ - يوميسان Yomesan عن طريق الفم جرعة واحدة بمعدل ٠,٢ - ٠,٥ ملجم/١٠٠ جرام من وزن الجسم للقضاء على الديدان المفلطحة والشريطية.

٢ - وبعد ثلاثة أيام من العلاج الأول يعطى عن طريق الفم ميبندازول جرعة واحدة بمعدل ١٠ ملجم/١٠٠ جم من وزن الجسم عن طريق الفم للقضاء على الديدان الأسطوانية.

المراجع الأجنبية

- Axelrod, H. R. (1962):
Exotic tropical fishes. Bailey Bros.
- Fasset, N. C. (1957):
Amanal of aquatic plants Univ. Wisc. Press, Madison, Wisc.
- Gohm D. (1970):
Tropical fish. Hamlyn, London.
- G. Cust and G. Cox. (1972):
Fresh water and Marine. Hamlyn, London.
- Lovell T. (1989):
Nutrition and feeding of fish. Published by Van Nostrand Reinhold
New York.
- Nimi, A. J. (1983):
Biological and toxicological effects of environmental contaminants to
fish and their eggs. Can. J. Aquat. Sci, 40: 306.
- Post. G. (1987):
Text book of Fish Health 2nd Ed. T.F.H. Publications, Inc.
- Piper etal. (1989):
Fish hatchery management Fish and Wildlife Servia. Washington,
D.C.
- Reid G. K. (1987):
Pond life Golden Press. New York.
- Wilke H. (1997):
Turtles and Tortoises Caring for them, feeding them, Understanding
them. Family Pet series. Barron's.

- Paysan K. (1979): The Hamlyn Guide to Aquarium Fishes.

London – New york, Hamlyn.

- O'connell R. F. (1977):

The Freshwater Aquarium Arco Publishing Company, Inc.

المراجع العربية

• الزراعة المائية للنباتات الداخلية (١٩٨٨):

ترجمة دريد نوايا.

• أسماك الزينة - د. إيمان محمد كامل، د. أسامة رشاد حبيب، د. محمد

عثمان الزرو، د. حسام يونس درويش، د. مدحت محمد على (١٩٨٨).


دار الشعب للطباعة.

• أسماك الزينة (١٩٩٧):

د. محمد السيد أرنأؤوط - هديل للنشر والتوزيع.

محتويات الكتاب


| | |
|--|----|
| مقدمة | ٣ |
| الفصل الأول : أساسيات التربية | |
| • التركيب الظاهري لجسم الأسماك | ٥ |
| • أنواع أحواض التربية وشروطها | ٨ |
| • المعدات اللازمة لحوض التربية | ١٢ |
| • خطوات إعداد الحوض للتربية | ٢١ |
| • النباتات المائية بالحوض وأنواعها وخصائصها | ٢٤ |
| الفصل الثانى : أسماك الزينة | |
| • أسماك الزينة وأنواعها | ٣٢ |
| الفصل الثالث : المعاملة الصحية للحوض وطرق رعاية الأسماك | |
| معاملة الحوض والرعاية الصحية | ٥٤ |
| الفصل الرابع : التغذية وأنواع الغذاء | |
| • التغذية فى أسماك الزينة | ٥٧ |
| الفصل الخامس : الأمراض التى تصيب أسماك الزينة | |
| • أعراض ظهور المرض - الوقاية - كيفية التصرف عند ظهور المرض . | ٦٢ |
| • أهم أمراض الأسماك وطرق العلاج | ٦٥ |
| الفصل السادس : تفريخ أسماك الزينة | |
| • التزاوج الطبيعى وتغذية ورعاية الصغار | ٦٨ |
| • تفريخ أسماك الانجل - السمكة الذهبية - الديسكس | ٧٤ |
| الفصل السابع : تربية ورعاية السلاحف المائية | |
| • الرعاية وإعداد الحوض والتربية - أنواع السلاحف والتغذية | ٧٧ |
| • الأمراض التى تصيب السلاحف وطرق علاجها | ٨٠ |
| المراجع | ٨٣ |



شكل رقم (٢) سمكة بلاتى



شكل رقم (١) سمكة جوبى




شكل رقم (٣) سمكة المولى شرعية
الزعنفة

شكل رقم (٤) سمكة المولى السوداء
(بلاك مولى)




شكل (٨) سمكة الجرامى الفضى



شكل (٥) سمكة سوردتال (سييفية الذيل)




شكل (٩) سمكة الجرامى الأزرق



شكل (٦) سمكة سياميس (السمكة المقاتلة
أو سمكة الفيتز)



شكل (١٠) السمكة الذهبية



شكل (٧) السمكة جرامى الأزرق




شكل (١١) سمكة النمر (البارب النمر)

شكل رقم (١٢) سمكة بارب الاسود



شكل رقم (١٢) سمكة الأرملة السوداء



شكل رقم (١٥) سمكة الأنجل



شكل رقم (١٤) السمكة الذهبية



شكل رقم (١٦) الأسماك المخططة زبرادانيو




شكل رقم (١٨) هارل كوين

راسبورا




شكل رقم (١٧) سمكة القرص (الديسكس)

شكل رقم (١٩) (سمكة ردتيل بلاك شارلث)



أو سمكة القرش ذات الذيل الأحمر



شكل رقم (٢١) سمكة كاردينال نيون




شكل رقم (٢٠) سمكة كوريدواس




شكل رقم (٢٢) سمكة التلسكوب



شكل رقم (٢٢) سمكة القط الماصة بليكوستوموس




شكل رقم (٢٤) سمكة بلاك مولى



شكل رقم (٢٥) سمكة الزبرا دانيو



شكل رقم (٢٦) نباتات حوض التربية



شكل رقم (٢٧) نباتات حوض التربية



أبو نجيتون


أبونو جيتون



أكينودورس




شكل رقم (٢٨) نباتات حوض التربية



شكل (٢٩-أ) عائلة شراكيدى وتضم التترا بأنواعها المختلفة

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| ١- تترا وردى ذكر | ٨- تترا جريمس ذكر |
| ٢- تترا وردى أنثى | ٩- تترا جريمس أنثى |
| ٣- تترا كاليستس صغير | ١٠- تترا شعلة ذكر |
| ٤- تترا سيربى | ١١- تترا شعلة أنثى |
| ٥- تترا كاليستس كاليستس | ١٢- تترا ليمونى |
| ٦- تترا أورتاتس ذكر | ١٣- تترا أصفر |
| ٧- تترا أورتاتس أنثى | ١٤- تترا قلب دموى ذكر |



شكل (٢٩-ب) عائلة شراكيدى وتضم التترا بأنواعها المختلفة


- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| ١٥- تترا ذو القلب الدموى أنثى | ٢٣- تترا فيلمى ذكر |
| ١٦- تترا ثلاثى الألوان | ٢٤- تترا فيلمى أنثى |
| ١٧- تترا لورتونسيس | ٢٥- تترا مخطط أنثى |
| ١٨- تترا سيميولانس | ٢٦- نيون تترا |
| ١٩- بلاك نيون | ٢٧- تترا كاردينال ذكر |
| ٢٠- تترا هيربى | ٢٨- تترا كاردينال أنثى |
| ٢١- تترا علم ذكر | ٢٩- تترا فضى |
| ٢٢- تترا علم أنثى | ٣٠- استيناكس ذو بقعتين |



شكل (١-٣٠) عائلة كبرينيدى
وتتضم أسماك البارب المختلفة

- ٥- بارب أخضر ذكر
- ٦- بارب مخطط ذكر
- ٧- بارب مخطط أنثى
- ٨- بارب أسود ذكر


- ١- بارب باريليويدس ذكر
- ٢- بارب باريليويدس أنثى
- ٣- بارب قزم
- ٤- بارب أخضر أنثى



شكل (٣٠ - ب) عائلة كبرينيدى وتضم أسماك البارب المختلفة


- ١٤- بارب صغير الفم ذكر
- ١٥ - بارب صغير الفم أنثى
- ١٦ - بارب كرىزى أنثى
- ١٧ - بارب كرىزى ذكر

- ٩ - بارب أسود أنثى
- ١٠ - بارب ذهبى
- ١١ - بارب النمر
- ١٢ - بارب النمر أبيض
- ١٣ - بارب متعدد الخطوط



شكل (٣١-أ) عائلة كبرينيدى وتضم أسماك
هارل كوين وكلودمونتان (١-١٨ جنس راسبورا)

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| ١- راسبورا فضى | ٨- راسبورا منقط العين |
| ٢- راسبورا فائق الجمال | ٩- راسبورا ذو الخطوط السوداء |
| ٣- راسبورا اسطوانى | ١٠- راسبورا كالى |
| ٤- راسبورا مقص الذيل | ١١- راسبورا بورا بيتنيسيس |
| ٥- راسبورا مشع أو براق | ١٢- راسبورا هارل كوين |
| ٦- راسبورا الخطوط الحمراء | ١٣- راسبورا هينجىلى |
| ٧- راسبورا ضخمة العين | ١٤- راسبورا لؤلؤى ذكر |



شكل (٣١ - ب) عائلة كبرينيدى وبعض العائلات الأخرى
 (١٩-٢٤: أسماك شبيهة الشعبان "Snake - like kuhlieel"
 (٢٦ - ٢٨: أسماك اللتش الماصه "Sucking loach")



شكل (١- ٣٢) عائلة شيكليدى وتضم أسماك
الأنجل والديسكس (القرص)

١- ٤ أسماك الانجل أو الملاك

٥- القرص الأزرق

٦- القرص الأخضر



شكل (٣٢-ب) عائلة شيكليدي

- ١١ - شيكلد برتقالى
- ١٢ - شيكلد ذو بقع (عمر صغير)
- ١٣ - شيكل ذو الخمس بقع ذكر

- ٧ - القرص البنى
- ٨ - شبيه القرص
- ٩ - شيكلد شوكى الزعانف
- ١٠ - شيكلد أخضر



شكل (٢٣) الفيرموث Firemouth (طولها يصل إلى ١٠.١ سم) وتتميز بوجود خط أحمر ناري يمتد أسفل البطن حتى الفم وهي من الأنواع الشرسة ولا تربي مع الأسماك الصغيرة




شكل (٢٤) زبرا شيكلد من الأسماك الشرسة وطولها يصل إلى ١٠.١ سم

شكل (٢٥) امراض اسماك الزينة



مرض تآكل أو تمزق الذيل
والزعانف وتبدو الزعانف
مهترئة وسبب المرض أنواع
معينة من البكتريا




مرض القطيفة

Velvet disease

يظهر على الجسم على هيئة
غبار لامع والأسماك تبدو في
حالة ترنج جزئي ولا تفرد
الزعانف وتظهر الزعانف
لامعة مع صعوبة التنفس

النقاط أو البقع البيضاء
whitespots مسببة طفيل
حيث يظهر على الأسماك
رشح مثل الملح (نقط بيضاء)
وتبدأ الإصابة على الزعانف
ثم تنتشر إلى باقى أجزاء الجسم



ظهور مناطق بيضاء ثم
نقط بيضاء على الزعانف
وجلد وعين الأسماك
(مرض النقط البيضاء)

مرض الكوستيا costia وهو طفيل
خطير يؤدي إلى النفوق السريع وتتميز
أعراضه بالترنج وجمع الذيل والزعانف
وترقد الأسماك المصابة في القاع
وتكون ضامة الزعانف.
وتعالج الأسماك المصابة بعمل حمام
مائي مكون من ٢ لتر ماء يضاف إليها
٣٠ جم ملح طعام لمدة ٤٥ دقيقة



بروز العين إلى الخارج (pop Eye)
أو ظهور بقع بنية اللون أو بروز
القشور (حراشيف) وسببه طفيليات
أو بكتيريا. ويعالج بعمل حمام وذلك
بوضع الأسماك المصابة في ٤,٥ لتر ماء
درجة حرارته ٢٦ م° ويحتوى على نقطة
واحدة من محلول النوشادر المركز.
وتترك الأسماك المصابة لمدة ٣ ساعات في
هذا المحلول ثم تنقل إلى حوض التربية



فطر الشم




فطر الجسم





الإصابة بالفطريات وخاصة الفطر الأبيض وهو مرض
سريع الانتشار ويؤدي إلى النفوق (عبارة عن زغب أبيض
يسببه فطر يسمى سابروولجنيا saprolegnia)


السحفاة المنقطة




سحفاة البرك الغربية




سحفاة ذات الغطاء الأملس




شكل (٣٦) أنواع السلاحف المائية



السلاحف ذات
البطن الأحمر




السلاحف الملونة أو المزركشة




السلاحف المنزلة


السحفاة المقلعة



سحفاة الطمى



السحفاة النهاشة



كتاب المعارف العلمي

لاشك أن القرن القادم هو عصر العلوم .. وأن البشرية تتحرك بخطى سريعة ومذهلة نحو ثورات وقفزات علمية هائلة ، يتحقق فيها ببساطة ما كان بالأمس أحد دروب المستحيل أو أحلام اليقظة .

إن دار المعارف - رائدة صناعة الكتاب - تقدم إلى القارئ العربي ((كتاب المعارف العلمي)) مشاركة منها في نشر الثقافة العلمية .. لغة العصر .



دارالمعارف



٠٢٠٥٨٨/٠١